herpy

CECILIE

Congo Caecilian

Herpele squalostoma

Herpele squalostoma è una cecilia robusta e fossoria delle foreste pluviali, delle piantagioni e dei giardini dell'Africa centrale, lunga fino a circa 46 cm. Depone le uova nel terreno e la femmina resta arrotolata attorno alle uova e ai piccoli, che si nutrono del suo strato cutaneo più esterno. In cattività la specie si è dimostrata resistente rispetto ad altre cecilie.

Famiglia: Herpelidae Nome precedente: *Caecilia squalostoma*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**24-46 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Scavatore**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee	**Nessuna nota**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**60 × 40 × 40 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**22-25 °C**
Temperatura, notte	**21-23 °C**
Umidità	**90-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Non necessari**
Alimentazione	**Insetti e vermi/lumache**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Sviluppo diretto (senza larve)**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per stagione	**16**
Cure parentali	**Sorveglia le uova**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

H. squalostoma si tiene in piccoli gruppi, e la gestione si basa sulla specie stessa e su altre cecilie terricole. L'animale è terricolo e scavatore, quindi la cura riguarda soprattutto il substrato.

TEMPERATURA

La specie si tiene a temperature stabili e miti: 22-25 °C di giorno e 21-23 °C di notte. La temperatura media del terreno influisce su quanto gli animali mangiano, quindi va mantenuta costante.

UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE

L'aria nella vaschetta è quasi satura, 90-100 %, perché il terreno è umido. L'umidità si mantiene nebulizzando il substrato e rivoltando ogni tanto i primi centimetri.

ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA

La specie non ha bisogno di ciotola dell'acqua né di una zona acquatica. L'umidità proviene dal terreno, e la condensa sulle pareti della vaschetta basta per bere. Una ciotola dell'acqua può rendere il substrato troppo bagnato.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie vive sottoterra e non serve uno specifico programma di illuminazione. Basta il normale ritmo giornaliero della stanza con 10-14 ore di luce.

ALIMENTAZIONE

I lombrichi sono un alimento di base collaudato: i giovani possono crescere fino a diventare adulti grandi e robusti nutriti solo con lombrichi, se i lombrichi vengono integrati con calcio e vitamine.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

H. squalostoma trascorre quasi tutta la vita sottoterra e si vede raramente in superficie.

AREALE D'ORIGINE

Nigeria, Camerun, Guinea Equatoriale, Gabon, Congo-Brazzaville, Congo - Kinshasa e Repubblica Centrafricana.