herpy

CECILIE

Aqua Ize Caecilian

Schistometopum thomense

Schistometopum thomense è un anfibio apode e scavatore, un cecilide che vive solo a São Tomé e sulla piccola isola vicina di Ilhéu das Rolas, nel Golfo di Guinea. È spesso di un giallo vivace, partorisce piccoli vivi e già completamente sviluppati ed è uno dei pochi cecilidi allevati in cattività. La gestione ruota attorno a un terriccio profondo e umido, privo di fertilizzanti e pesticidi.

Famiglia: Dermophiidae **Tossine cutanee lievi**

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**20-34 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno e di notte**
Stile di vita	**Scavatore**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee	**Lievi** Lavati le mani dopo il contatto e tieni le dita lontane da occhi e bocca
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**50 × 30 × 30 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**21-24 °C**
Temperatura, notte	**20-22 °C**
Umidità	**85-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Non necessari**
Alimentazione	**Insetti e vermi/lumache**
Detenzione	**Singolarmente o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Vivipara**
Sviluppo	**Vivipara**
Maturità sessuale	**24 mesi**
Piccoli per parto	**1-16 piccoli**
Cure parentali	**Nessuna**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	La specie è terricola e scavatrice, quindi la gestione riguarda soprattutto il substrato. Viene tenuta e allevata in piccoli numeri, e le indicazioni si basano sulla specie stessa e su altri cecilidi terricoli.
TEMPERATURA	La temperatura diurna è di 21-24 °C e quella notturna di 20-22 °C, il che corrisponde al terreno delle foreste montane della specie. Di norma il riscaldamento non è necessario in una stanza a temperatura stabile.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità nel contenitore è dell'85-100 %, perché il substrato è umido. L'umidità si mantiene nebulizzando il substrato e rivoltando ogni tanto i primi centimetri superiori.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	La specie non ha bisogno di ciotola per l'acqua né di una parte acquatica. L'umidità proviene dal substrato, e la condensa sulle pareti del contenitore basta per bere.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è attiva sia di giorno sia di notte e all'inizio si mostra spesso in superficie; dopo alcune settimane di ambientamento si vede più di rado.
ALIMENTAZIONE	I lombrichi sono il cibo base e vengono accettate anche le larve della tarma della cera. Un adulto riceve 10-15 piccoli lombrichi ogni due settimane.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*S. thomense* scava estesi sistemi di gallerie. In natura più animali stanno raggruppati nello stesso ceppo. La specie può sporgere la testa dal terreno e restare così fino a 20 minuti senza reagire ai movimenti vicini.
AREALE D'ORIGINE	São Tomé e Príncipe.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/cecilie/schistometopum-thomense