herpy

CECILIE

Rubber Eel

Typhlonectes natans

Typhlonectes natans è un anfibio apode completamente acquatico, originario di Colombia e Venezuela, con corpo lungo, liscio e di colore grigio-bluastro scuro, occhi piccoli coperti dalla pelle e una bassa pinna dorsale. La specie partorisce piccoli vivi e va tenuta in un acquario con acqua calda, dolce e ben filtrata, chiuso da un coperchio pesante e ben aderente.

Famiglia: Typhlonectidae **Tossine cutanee lievi**

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**25-73 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**40-250 g**
Aspettativa di vita	**10-14 anni**
Attività	**Di giorno, al crepuscolo e di notte**
Stile di vita	**Acquatico**
Habitat	**Savana e zona umida**
Tossine cutanee	**Lievi** Lavati le mani dopo il contatto e tieni le dita lontane da occhi e bocca
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**120 × 45 × 50 cm** L × P × H per 3 adulti
Temperatura, giorno	**24-30 °C**
Temperatura, notte	**24-30 °C**
Umidità	**100%**
Acqua	**Acquaterrario** profondità 30-40 cm
Temperatura dell'acqua	**24-30 °C**
UVB	**Non necessari**
Alimentazione	**Insetti, mangime completo, vertebrati e vermi/lumache**
Detenzione	**In gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Vivipara**
Sviluppo	**Vivipara**
Maturità sessuale	**48 mesi**
Piccoli per parto	**1-11 piccoli**
Gestazione	**210-300 giorni**
Cure parentali	**Nessuna**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Typhlonectes natans si tiene in un acquario. Per tre adulti servono almeno 120 × 45 × 50 cm (circa 250 litri) con un grande filtro esterno. Quanto maggiore è il volume d'acqua, tanto più stabile è la qualità dell'acqua.

TEMPERATURA

La temperatura dell'acqua deve essere di 24-30 °C. Una naturale variazione stagionale entro questo intervallo imita i fiumi dell'areale e può favorire la riproduzione. Intorno ai 32 °C si ha stress da caldo.

UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE

L'umidità dell'aria non ha importanza, perché l'animale vive in acqua. L'aria sotto un coperchio ben aderente è satura di umidità, ed è per questo che nella scheda compare 100 %.

ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA

Le cecilie assorbono sostanze attraverso la pelle, quindi la qualità dell'acqua è fondamentale. Il filtro deve essere già maturo prima dell'inserimento degli animali.

ILLUMINAZIONE E UVB

Basta una normale illuminazione da acquario per 12 ore al giorno. Gli animali preferiscono l'oscurità, quindi devono sempre esserci rifugi bui.

ALIMENTAZIONE

Typhlonectes natans mangia quasi ogni cibo di origine animale: lombrichi, grilli, larve di coleotteri, gamberetti e altri crostacei, molluschi bivalvi, larve di zanzara, pesce scongelato, topolini appena nati e mangime pronto per anfibi.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

La specie è pacifica, non territoriale e sta meglio in gruppo, con gli animali che condividono i rifugi.

AREALE D'ORIGINE

Colombia e Venezuela.