herpy

GECHI

Bibron's thick-toed gecko

Chondrodactylus bibronii

Un geco rupicolo robusto e notturno, originario del Karoo e delle zone aride dell'Africa meridionale, con dita spesse, pelle bitorzoluta e bande trasversali scure. È resistente e facile da allevare, ma viene spesso venduto con il nome sbagliato: molti animali in commercio sono in realtà la specie affine *Chondrodactylus turneri*.

Famiglia: Gekkonidae Nome precedente: *Pachydactylus bibronii; Pachydactylus bibroni; Tarentola bibronii*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**15-20 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**6-8 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Rupicolo**
Habitat	**Semideserto e terreno roccioso**
Difficoltà	**Principiante**

CURA

Terrario min.	**60 × 40 × 40 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**24-28 °C**
Punto caldo	**30-33 °C**
Temperatura, notte	**19-23 °C**
Umidità	**30-50%**
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente, in coppia o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**1-2 uova**
Deposizioni all'anno	**2-6**
Incubazione	**45-60 giorni** a 27-28 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Un singolo adulto o una coppia richiede un terrario di almeno 60 × 40 × 40 cm (lunghezza × larghezza × altezza), e più grande è meglio.
TEMPERATURA	La specie se la cava con un calore normale, purché una parte del terrario sia più calda del resto. Mantieni 24-28 °C di giorno con un angolo caldo di 30-33 °C, e lascia scendere la temperatura a 19-23 °C di notte.
UMIDITÀ E ACQUA	La specie proviene da zone aride, e il terrario deve essere asciutto e ben ventilato, con un'umidità di circa 30-50 %.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è notturna e non ha bisogno di UVB se gli insetti vengono cosparsi di calcio e vitamina D3, ma molti animali in cattività si crogiolano volentieri sotto una luce debole.
ALIMENTAZIONE	Il geco è insettivoro e mangia quasi tutto ciò che riesce a sopraffare. Grilli e camole della farina sono l'alimento base classico, integrati da locuste, scarafaggi dubia e, di rado, larve della tarma della cera.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è territoriale e i maschi adulti si scontrano, spesso al punto di perdere dita o lembi di pelle. I maschi non devono quindi mai essere tenuti insieme.
AREALE D'ORIGINE	Sudafrica, Namibia e Botswana.