herpy

GECHI

Pegu bent-toed gecko

Cyrtodactylus peguensis

Un geco notturno originario di Myanmar, Thailandia e Malesia occidentale, noto per le foreste di Pegu. Esistono pochissime informazioni affidabili sull'allevamento della specie, quindi la guida si basa sull'esperienza con altre specie del genere e va intesa come un punto di partenza prudente.

Famiglia: Gekkonidae Nome precedente: *Gymnodactylus peguensis*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**7 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**8-10 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 40 × 60 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**23-27 °C**
Temperatura, notte	**20-23 °C**
Umidità	**60-90%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**1-2 uova**
Incubazione	**90-150 giorni** a 22-25 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	L'allevamento di *Cyrtodactylus peguensis* non è descritto, quindi la guida si basa su specie affini del genere e sulle esigenze dei gechi notturni e arrampicatori di ambienti umidi.
TEMPERATURA	Di giorno devono esserci 23-27 °C e di notte 20-23 °C, come per le specie affini di foresta umida. Non è documentata la necessità di un punto caldo di basking, e la specie non è nota per fare basking.
UMIDITÀ E ACQUA	*Cyrtodactylus peguensis* dipende probabilmente da un'elevata umidità dell'aria. Mantienila al 60-90 %, con i valori più alti di notte.
ILLUMINAZIONE E UVB	*Cyrtodactylus peguensis* è notturno e si accontenta di un'illuminazione debole. I raggi UVB non sono necessari, ma una luce UVB debole è un vantaggio.
ALIMENTAZIONE	*Cyrtodactylus peguensis* è insettivoro. Offri grilli, blatte dubia e insetti simili, più piccoli della distanza tra gli occhi dell'animale.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	Il genere ha fama di essere timido, veloce e dotato di pelle sottile e delicata che si strappa facilmente. Se viene afferrato, può mordere.
AREALE D'ORIGINE	Myanmar (Birmania), Thailandia e Malaysia.