herpy

GECHI

Pacific gecko

Dactylocnemis pacificus

Un gechide notturno nervoso, veloce e dalla bella livrea, originario della parte nord-occidentale dell'Isola del Nord della Nuova Zelanda, dove vive tra macchia, foresta e coste rocciose. Partorisce piccoli vivi, raggiunge 14-18 cm di lunghezza e può superare i 20 anni di età. Si trova a suo agio in un clima fresco e temperato.

Famiglia: Diplodactylidae Nome precedente: *Hoplodactylus pacificus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**14-18 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**20-25 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Arboricolo, rupicolo e terrestre**
Habitat	**Terreno roccioso e bosco e prato temperati**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**50 × 50 × 100 cm** L × P × H per 3 adulti
Temperatura, giorno	**18-24 °C**
Temperatura, notte	**12-18 °C**
Umidità	**50-80%**
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti, frutta e nettare**
Detenzione	**Singolarmente o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Vivipara**
Maturità sessuale	**18-24 mesi**
Piccoli per parto	**1-2 piccoli**
Deposizioni all'anno	**1**
Gestazione	**270-360 giorni**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice III**
Allegato UE	**Allegato C**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	La gestione di *Dactylocnemis pacificus* è descritta solo in modo sommario.
TEMPERATURA	Le temperature non sono documentate per la specie in cattività e seguono il clima dell'areale. Di giorno nel terrario devono esserci 18-24 °C e di notte 12-18 °C, in modo che si raffreddi naturalmente.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere del 50-80 %. Nebulizza leggermente il terrario la sera, in modo che foglie e corteccia siano umide durante la notte, e lascia che asciughi in parte nel corso della giornata.
ILLUMINAZIONE E UVB	*Dactylocnemis pacificus* è notturna e si scalda al sole solo nascosta vicino al rifugio diurno, perciò non ha un fabbisogno documentato di UVB.
ALIMENTAZIONE	*Dactylocnemis pacificus* è onnivora, ma si nutre soprattutto di insetti. In natura prende falene, mosche, coleotteri, cavallette e altri invertebrati, e lecca nettare, succo di piccoli frutti e melata prodotta dalle cocciniglie.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Dactylocnemis pacificus* è veloce, nervosa e perde facilmente la coda, perciò la manipolazione va ridotta al minimo. Spostala solo quando è necessario e lasciala correre da una mano all'altra sopra una superficie bassa e morbida.
AREALE D'ORIGINE	Nuova Zelanda.