herpy

GECHI

Ebenavia boettgeri

Ebenavia boettgeri è un geco piccolo e slanciato delle foreste pluviali di pianura lungo la costa orientale del Madagascar, lungo circa 6-8 cm coda compresa. Per molti anni è stato considerato parte di *Ebenavia inunguis* e solo dal 2018 è di nuovo una specie a sé. Si sa poco sulla sua gestione.

Famiglia: Gekkonidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**6-8 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**5-8 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**30 × 30 × 30 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**26-28 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**70%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Insetti e piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**1-2 uova**
Incubazione	**60-90 giorni** a 24-27 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Si sa poco sulla gestione di *Ebenavia boettgeri*. I valori indicati nella guida sono presi da *Ebenavia inunguis*, il parente più vicino e meglio conosciuto, e corrispondono al clima dell'areale.

TEMPERATURA

Di giorno il terrario va mantenuto a 26-28 °C. Di notte la temperatura scende a circa 22 °C in estate e 18 °C in inverno. Un tubo fluorescente di solito produce abbastanza calore.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità dell'aria deve aggirarsi intorno al 70 %. È facile mantenerla nebulizzando il terrario una volta al giorno, meglio la sera, in modo che foglie e corteccia si inumidiscano.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie è notturna e di giorno si nasconde. Il terrario viene illuminato e riscaldato con un tubo fluorescente, acceso 12 ore al giorno in estate e 10 ore in inverno, comandato da un timer. I raggi UVB sono facoltativi.

ALIMENTAZIONE

Offri piccoli insetti e altri piccoli artropodi più piccoli della testa dell'animale: moscerini della frutta, collemboli, grilli appena nati e piccoli, e piccoli isopodi.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Ebenavia boettgeri è lento e furtivo e non adatto alla manipolazione.

AREALE D'ORIGINE

Madagascar.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/gechi/ebenavia-boettgeri