herpy

GECHI

Bauer's chameleon gecko

Eurydactylodes agricolae

Eurydactylodes agricolae è un piccolo geco slanciato e arrampicatore delle foreste della Nuova Caledonia nord-occidentale, con pelle granulosa dal verde oliva al verde muschio e marcature gialle attorno alla bocca e sugli arti. Sopporta male il caldo, ma non è difficile da mantenere in un terrario fresco, umido e fittamente piantumato.

Famiglia: Diplodactylidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**5-6 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno e al crepuscolo**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta pluviale**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**30 × 30 × 45 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**18-24 °C**
Temperatura, notte	**16-20 °C**
Umidità	**60-90%**
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti e mangime completo**
Detenzione	**Singolarmente, in coppia o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**18-36 mesi**
Uova per deposizione	**1-2 uova**
Deposizioni all'anno	**5-7**
Incubazione	**60-120 giorni** a 22-25 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Quasi minacciata (NT)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Un esemplare adulto di *Eurydactylodes agricolae* o una coppia può essere tenuto in un terrario di almeno 30 × 30 × 45 cm (lunghezza × larghezza × altezza), e più alto è sempre meglio.

TEMPERATURA

Eurydactylodes agricolae proviene da foreste a temperatura moderata e sopporta male il caldo. Mantieni 18-24 °C di giorno: gli animali stanno bene a normale temperatura ambiente. Di notte la temperatura può scendere a 16-20 °C.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità per *Eurydactylodes agricolae* deve essere da moderata ad alta e variare nell'arco della giornata. Punta a 60-70 % durante il giorno e 80-90 % dopo la nebulizzazione serale.

ILLUMINAZIONE E UVB

Eurydactylodes agricolae è attivo di giorno e al crepuscolo e si espone volentieri sotto la luce UVB. Garantisci un ritmo giornaliero regolare con 10-14 ore di luce. Gli UVB non sono strettamente necessari.

ALIMENTAZIONE

L'alimentazione di base per *Eurydactylodes agricolae* è una pappa in polvere già pronta per gechi della Nuova Caledonia frugivori, da sciogliere fino a ottenere un composto morbido.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Eurydactylodes agricolae è piccolo, veloce e fragile, e soprattutto un animale da osservare. Con pazienza può abituarsi a una manipolazione breve e tranquilla.

AREALE D'ORIGINE

Nuova Caledonia.