herpy

GECHI

Common dwarf gecko

Lygodactylus capensis

Lygodactylus capensis è un piccolo geco nano grigio-bruno dell'Africa meridionale e orientale, dove vive sugli alberi della savana e del bosco aperto e spesso anche sui muri delle case. È diurno, raggiunge i 7-9 cm coda compresa e pesa meno di 1 g. È la specie tipo del genere e in natura è comune, ma in cattività viene allevata raramente.

Famiglia: Gekkonidae Nome precedente: *Hemidactylus capensis; Lygodactylus strigatus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**7-9 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**0,7-1,1 g**
Aspettativa di vita	**4-6 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Savana**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**30 × 30 × 40 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**25-30 °C**
Punto caldo	**30-35 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**50-75%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Insetti e piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**9-15 mesi**
Uova per deposizione	**1-2 uova**
Incubazione	**60-120 giorni** a 24-27 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Si sa poco sull'allevamento di *Lygodactylus capensis*. Il clima dell'areale è caldo, con piogge in estate e un inverno secco e più fresco, e la specie vive sugli alberi di savana e bosco aperto.

TEMPERATURA

Di giorno la temperatura di fondo deve essere di 25-30 °C, con un punto caldo di 30-35 °C sotto un piccolo faretto.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità dell'aria si mantiene al 50-60 % di giorno e al 60-75 % di notte. Nebulizza leggermente ogni mattina, in modo che foglie e pareti si coprano di gocce, e lascia asciugare il terrario nel corso della giornata.

ILLUMINAZIONE E UVB

Lygodactylus capensis sta spesso in pieno sole e ha bisogno di una luce intensa e uniforme. Usa tubi fluorescenti T5 o LED a luce diurna, in combinazione con un tubo UVB.

ALIMENTAZIONE

In natura le formiche costituiscono il 30-50 % della dieta. In terrario la dieta è composta da piccoli insetti vivi: piccoli grilli, moscerini della frutta, collemboli, bruchidi, piccoli isopodi e piccole blatte.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Lygodactylus capensis è rapido e può facilmente scappare o farsi male, e la coda si perde con facilità, per cui la specie non si presta a essere maneggiata.

AREALE D'ORIGINE

Sudafrica, eSwatini, Mozambico, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Angola, Zambia, Malawi, Congo - Kinshasa, Tanzania e Kenya.