herpy

GECHI

Cameroon dwarf gecko

Lygodactylus conraui

Un piccolo rampicatore diurno delle foreste dell'Africa occidentale, l'unico geco verde della regione. Si trova sui tronchi, sulle foglie di palma e sui muri delle case, nei margini ombreggiati della foresta. È raro nei terrari e la sua gestione si basa su quella di specie di gechi diurni nani strettamente imparentati.

Famiglia: Gekkonidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**7-9 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**5-8 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta pluviale**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**30 × 30 × 45 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**24-27 °C**
Punto caldo	**32-34 °C**
Temperatura, notte	**21-24 °C**
Umidità	**60-80%**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Insetti, nettare e mangime completo**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**4-8 mesi**
Uova per deposizione	**2 uova**
Incubazione	**60-120 giorni** a 24-28 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	La gestione di *Lygodactylus conraui* si basa sulla specie strettamente imparentata *Lygodactylus williamsi* e sul modo di vivere della specie in natura.
TEMPERATURA	*L. conraui* vive nelle pianure calde e umide. Di giorno devono esserci 24-27 °C con un punto di sole a 32-34 °C, che l'animale può raggiungere e lasciare a piacere.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere del 60-80 %, più alta in basso.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e ha bisogno di una luce intensa a spettro completo. Usa tubi fluorescenti T5, uno con luce diurna a circa 6500 K e uno con UVB.
ALIMENTAZIONE	In natura la specie si nutre di artropodi molto piccoli, soprattutto piccole farfalle e termiti.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Lygodactylus conraui* è un animale da osservare, non da prendere in mano. I gechi nani sono piccoli, veloci e fragili, e la manipolazione li stressa e può costare la coda.
AREALE D'ORIGINE	Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun e Guinea Equatoriale.