herpy

GECHI

## Tiger thick-toed gecko

# *Pachydactylus tigrinus*

Un piccolo geco rupicolo dalla corporatura robusta, con bande trasversali brune e crema che ricordano il disegno di una tigre. Vive nella savana e in ambienti rocciosi dell'Africa meridionale ed è notturno. Si sa poco sulla sua gestione in cattività, perciò i consigli si basano su habitat, clima e specie affini.

Famiglia: Gekkonidae  Nome precedente: *Pachydactylus capensis tigrinus; Pachydactylus capensis rhodesianus*

### DATI ESSENZIALI

#### L'ANIMALE

| | |
|---|---|
| Dimensioni da adulto | **9-11 cm**<br>lunghezza totale inclusa la coda |
| Aspettativa di vita | **5-10 anni** |
| Attività | **Di notte** |
| Stile di vita | **Arboricolo e rupicolo** |
| Habitat | **Savana e terreno roccioso** |
| Difficoltà | **Intermedio** |

#### CURA

| | |
|---|---|
| Terrario min. | **40 × 30 × 30 cm**<br>L × P × H per 2 adulti |
| Temperatura, giorno | **24-28 °C** |
| Punto caldo | **30-33 °C** |
| Temperatura, notte | **18-22 °C** |
| Umidità | **30-50%** |
| UVB | **Facoltativi**<br>Zona Ferguson 1 |
| Alimentazione | **Insetti** |
| Detenzione | **Singolarmente o in coppia** |

#### RIPRODUZIONE

| | |
|---|---|
| Riproduzione | **Ovipara** |
| Uova per deposizione | **1-2 uova** |
| Incubazione | **55-75 giorni**<br>a 26-30 °C |

#### TUTELA E DOCUMENTI

| | |
|---|---|
| CITES | **Non elencata** |
| Allegato UE | **Non elencata** |
| IUCN | **Minima preoccupazione (LC)** |

## La cura in breve

| | |
|---|---|
| **IL TERRARIO** | Si sa poco sulla gestione di *Pachydactylus tigrinus*. |
| **TEMPERATURA** | Di giorno devono esserci 24-28 °C, e sotto una lampada riscaldante o su una pietra sotto la lampada 30-33 °C. Di notte la temperatura deve scendere a 18-22 °C. |
| **UMIDITÀ E ACQUA** | La specie vive in ambienti da aridi a semiaridi. Mantieni l'umidità intorno al 30-50 % e nebulizza leggermente ogni tanto sul fondale la sera, così che l'animale possa bere le gocce. |
| **ILLUMINAZIONE E UVB** | La specie è notturna e di giorno resta nascosta. I raggi UVB quindi non sono essenziali se il cibo viene spolverato con calcio e D3. |
| **ALIMENTAZIONE** | *Pachydactylus tigrinus* si nutre di insetti. Grilli, piccole blatte dubia, tenebrioni e cavallette di dimensioni adeguate sono una buona base alimentare. La preda deve essere più piccola della distanza tra gli occhi dell'animale. |
| **COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE** | Il geco è nervoso e veloce e si presta più a essere osservato che manipolato. Non afferrarlo mai per la coda, che può essere persa per autotomia. La vita sociale della specie non è documentata. |
| **AREALE D'ORIGINE** | Zimbabwe, Sudafrica, Botswana e Mozambico. |