herpy

GECHI

Middle Eastern short-fingered gecko

Stenodactylus doriae

Una delle specie più grandi del genere *Stenodactylus*: un geco terricolo snello e notturno, con zampe lunghe e dita frangiate, che di giorno si scava una tana nella sabbia. Le conoscenze sul suo mantenimento sono scarse, ma la specie può essere tenuta come i parenti più stretti, in un terrario sabbioso asciutto.

Famiglia: Gekkonidae Nome precedente: *Ceramodactylus doriae; Ceramodactylus major; Stenodactylus major*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**5-8 cm** lunghezza muso-cloaca
Peso	**5-11 g**
Aspettativa di vita	**9-10 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Terrestre e scavatore**
Habitat	**Deserto**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 40 × 20 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**24-29 °C**
Punto caldo	**35-38 °C**
Temperatura, notte	**18-24 °C**
Umidità	**40-60%**
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente, in coppia o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**8 mesi**
Uova per deposizione	**1-2 uova**
Incubazione	**60-80 giorni** a 27-30 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Le conoscenze sul mantenimento di *Stenodactylus doriae* sono scarse. L'allestimento segue quello dei parenti più stretti *Stenodactylus petrii* e *Stenodactylus sthenodactylus*, che provengono dagli stessi deserti.
TEMPERATURA	Di giorno nel terrario devono esserci 24-29 °C e 35-38 °C nel punto più caldo, ad esempio sopra un tappetino o un cavo riscaldante sotto il fondo oppure sotto una lampada a un'estremità.
UMIDITÀ E ACQUA	L'aria deve essere da poco a moderatamente umida, circa 40-60 %. Nebulizza leggermente una parte del terrario la sera una o due volte a settimana, così da creare zone umide e goccioline, e lascia il resto asciutto.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è notturna e può vivere senza UVB se riceve calcio con vitamina D3 attraverso il cibo. Una debole luce UVB su una parte del terrario è facoltativa, purché gli animali possano scavare e stare all'ombra.
ALIMENTAZIONE	L'alimentazione di base è costituita da insetti vivi, soprattutto grilli, integrati con larve della cera, camole della farina, mini camole e moscerini della frutta atteri.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Stenodactylus doriae* non è adatto alla manipolazione. È veloce e fragile, e può perdere la coda. Gli animali escono dopo il tramonto e passano il giorno nelle loro gallerie. I maschi possono emettere suoni.
AREALE D'ORIGINE	Arabia Saudita, Qatar, Iran, Iraq, Israele, Emirati Arabi Uniti, Oman, Giordania e Kuwait.