herpy

GECHI

## South-western spiny-tailed gecko

# *Strophurus spinigerus*

*Strophurus spinigerus* è un piccolo geco dalla coda spinosa originario dell'Australia sud-occidentale. Ha una colorazione grigio oliva con due file di spine nere sulla coda e spesso un'ampia striscia nera dentellata lungo il dorso. Di notte si arrampica su cespugli e alberi e, se spaventato, può spruzzare dalla coda un liquido appiccicoso e maleodorante.

Famiglia: Diplodactylidae  Nome precedente: *Diplodactylus spinigerus*

### DATI ESSENZIALI

#### L'ANIMALE

| | |
|---|---|
| Dimensioni da adulto | **9-11 cm**<br>lunghezza totale inclusa la coda |
| Aspettativa di vita | **6-10 anni** |
| Attività | **Al crepuscolo e di notte** |
| Stile di vita | **Arboricolo e terrestre** |
| Habitat | **Semideserto e bosco e prato temperati** |
| Difficoltà | **Intermedio** |

#### CURA

| | |
|---|---|
| Terrario min. | **30 × 30 × 45 cm**<br>L × P × H per 2 adulti |
| Temperatura, giorno | **25-30 °C** |
| Punto caldo | **30-32 °C** |
| Temperatura, notte | **18-25 °C** |
| Umidità | **40-60%** |
| UVB | **Consigliati**<br>Zona Ferguson 2 |
| Alimentazione | **Insetti** |
| Detenzione | **Singolarmente, in coppia o un maschio con più femmine** |

#### RIPRODUZIONE

| | |
|---|---|
| Riproduzione | **Ovipara** |
| Maturità sessuale | **12-24 mesi** |
| Uova per deposizione | **1-2 uova** |
| Deposizioni all'anno | **2-6** |
| Incubazione | **45-60 giorni**<br>a 27-30 °C |

#### TUTELA E DOCUMENTI

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendice III** |
| Allegato UE | **Allegato C** |
| IUCN | **Minima preoccupazione (LC)** |

## La cura in breve

| | |
|---|---|
| **IL TERRARIO** | Si sa poco sull'allevamento di *Strophurus spinigerus*. |
| **TEMPERATURA** | Di giorno devono esserci 25-30 °C e, su un ramo in alto, una zona di basking di 30-32 °C. Di notte il riscaldamento si spegne e la temperatura può scendere a 18-25 °C. |
| **UMIDITÀ E ACQUA** | L'umidità dell'aria deve essere moderata, circa 40-60 %, e il terrario deve asciugarsi completamente nel corso della giornata. |
| **ILLUMINAZIONE E UVB** | In natura la specie si espone al sole tra i rami sottili, quindi i raggi UVB sono un vantaggio. |
| **ALIMENTAZIONE** | In natura il genere si nutre di artropodi: ragni, scarafaggi, grilli, coleotteri, termiti e le loro larve. In terrario vanno bene piccoli grilli, scarafaggi, falene, mosche e larve della tarma della cera. |
| **COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE** | *Strophurus spinigerus* è un animale da osservare e non dovrebbe essere maneggiato più del strettamente necessario. |
| **AREALE D'ORIGINE** | Australia. |