herpy

GECHI

Turnip-tailed gecko

Thecadactylus rapicauda

Uno dei più grandi gechi delle Americhe: un predatore da agguato notturno senza palpebre mobili, con pupille verticali, lingua blu e una coda che dopo la perdita ricresce spessa come una rapa. La specie è diffusa dal Messico al Brasile, ma è rara in terrario e sono disponibili solo poche informazioni affidabili sul suo mantenimento.

Famiglia: Phyllodactylidae Nome precedente: *Gekko rapicauda; Gekko laevis; Platydactylus theconyx*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**9-13 cm** lunghezza muso-cloaca
Peso	**16-40 g**
Aspettativa di vita	**8-12 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta secca e foresta pluviale**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 45 × 90 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**25-28 °C**
Punto caldo	**30-31 °C**
Temperatura, notte	**21-24 °C**
Umidità	**60-80%**
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**1-2 uova**
Incubazione	**150-200 giorni** a 24-28 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Un singolo animale richiede un terrario di almeno 60 × 45 × 90 cm (lunghezza × larghezza × altezza), una coppia almeno 70 × 70 × 90 cm.

TEMPERATURA

La specie è attiva entro un intervallo di temperatura relativamente ristretto. Di giorno devono esserci 25-28 °C, con un punto un po' più caldo di 30-31 °C nella parte alta del terrario, e di notte 21-24 °C.

UMIDITÀ E ACQUA

La specie richiede un'elevata umidità dell'aria. Mantienila al 60-80 %: l'umidità sale dopo una nebulizzazione serale e scende nel corso della giornata.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie è notturna e di giorno si nasconde in fessure buie, quindi gli UVB non sono necessari se il cibo è integrato con calcio e vitamina D3.

ALIMENTAZIONE

In natura la specie è un predatore da agguato con una dieta molto varia.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

L'animale è lento e posato quando non è minacciato, ma può essere vivace e aggressivo quando viene disturbato. Può mordere con forza, e stacca la coda anche con una pressione lieve.

AREALE D'ORIGINE

Messico, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Suriname, Guyana Francese, Brasile, Trinidad e Tobago, Aruba, Curaçao, Caraibi olandesi, Antigua e Barbuda, Saint Lucia e Grenada.