herpy

IGUANE

Green Anole

Anolis carolinensis

Anolis carolinensis è una lucertola snella e arrampicatrice del sud-est degli Stati Uniti, che passa dal verde al marrone a seconda di temperatura, luce e stato d'animo. Raggiunge 12-20 cm coda compresa, è diurna e si nutre di piccoli insetti. Richiede un terrario alto, luminoso e umido con UVB e un punto caldo per il basking; il maschio si tiene da solo oppure con un paio di femmine.

Famiglia: Dactyloidae Nome precedente: *Ameiua bullaris; Anolis baccatus; Anolis podargicus; Anolius carolinensis; Norops baccatus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**12-20 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**2-6 g**
Aspettativa di vita	**4-8 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Bosco e prato temperati**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 60 × 60 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**22-28 °C**
Punto caldo	**30-35 °C**
Temperatura, notte	**18-24 °C**
Umidità	**60-70%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**4-12 mesi**
Uova per deposizione	**1-2 uova**
Deposizioni all'anno	**6-10**
Incubazione	**35-49 giorni** a 28-30 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Un singolo anolide richiede un terrario di almeno 60 × 60 × 60 cm (lunghezza × larghezza × altezza). Più grande è meglio, soprattutto in altezza, perché la specie si arrampica e usa tutto lo spazio.
TEMPERATURA	Il punto di basking deve essere di 30-35 °C misurati sul ramo subito sotto la lampada riscaldante. Il resto del terrario si mantiene a 22-28 °C di giorno, e di notte vanno bene 18-24 °C.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere in media del 60-70 %, più bassa a metà giornata e più alta di notte.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e richiede luce intensa e UVB ogni giorno. Prende il sole in penombra, e la lampada UVB deve garantire la zona 2 di Ferguson, cioè un indice UV di al massimo circa 3 nel punto di basking.
ALIMENTAZIONE	*Anolis carolinensis* è insettivoro e cattura prede vive che si muovono.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	I maschi sono territoriali e si mettono in mostra annuendo con la testa, aprendo il lembo golare e gonfiandosi. Due maschi nello stesso terrario combattono, e il più debole si ferisce o soccombe allo stress.
AREALE D'ORIGINE	Stati Uniti.