herpy

IGUANE

Texas horned lizard

Phrynosoma cornutum

Phrynosoma cornutum è una lucertola larga e appiattita, con corna sul capo e due file di scaglie appuntite lungo i fianchi. Vive in praterie aperte e aride e in zone cespugliose degli Stati Uniti meridionali e del Messico settentrionale. Raggiunge 7-13 cm dal muso alla cloaca, è diurna e si nutre soprattutto di formiche. Proprio l'alimentazione è l'ostacolo principale: è difficile da sostituire, e questa specie è una delle lucertole più difficili da mantenere in terrario.

Famiglia: Phrynosomatidae Nome precedente: *Agama cornuta; Phrynosoma brevicornis; Phrynosoma bufonium; Phrynosoma harlanii; Phrynosoma planiceps*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**7-13 cm** lunghezza muso-cloaca
Peso	**25-90 g**
Aspettativa di vita	**7-9 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre e scavatore**
Habitat	**Semideserto e savana**
Difficoltà	**Specialista**

CURA

Terrario min.	**100 × 50 × 40 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**27-29 °C**
Punto caldo	**38-42 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**20-40%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**24 mesi**
Uova per deposizione	**14-37 uova**
Deposizioni all'anno	**1**
Incubazione	**40-61 giorni** a 27-30 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sul mantenimento di *Phrynosoma cornutum*. La gestione si basa quindi sull'habitat: terreno aperto e arido, suolo sciolto, sole intenso e un'alimentazione a base di formiche.
TEMPERATURA	La specie ama il sole e ha bisogno di una zona di termoregolazione dove la superficie raggiunga 38-42 °C, misurata con un termometro a infrarossi.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere bassa, 20-40 %, e il terrario deve asciugarsi completamente nel corso della giornata. Il substrato non deve essere bagnato.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e passa la giornata alla luce diretta del sole, quindi ha bisogno di luce intensa e di UVB tutto l'anno.
ALIMENTAZIONE	L'alimentazione è il limite decisivo. In natura circa il 70 % della dieta è costituito da formiche mietitrici (*Pogonomyrmex*), e i piccoli mangiano solo formiche piccole. Il resto sono termiti, coleotteri e cavallette.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Phrynosoma cornutum* è calma e tranquilla e vive da sola. Non si fa notare ed è facile da non vedere, perché si confonde con il substrato. Si muove a brevi tratti, solleva la parte anteriore del corpo e si guarda intorno.
AREALE D'ORIGINE	Stati Uniti e Messico.