herpy

IGUANE

Blue Spiny Lizard

Sceloporus cyanogenys

Sceloporus cyanogenys è una lucertola robusta, dalle scaglie ruvide, originaria delle zone rocciose del Texas meridionale e del Messico orientale. Il maschio ha gola e fianchi blu e un collare nero. La specie è diurna, si nutre di insetti e richiede un terrario spazioso e asciutto con rocce, UVB e un punto di termoregolazione caldo. Partorisce piccoli vivi ed è schiva e veloce.

Famiglia: Phrynosomatidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**25-36 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**5-7 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Rupicolo e terrestre**
Habitat	**Semideserto e terreno roccioso**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**100 × 50 × 50 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**27-31 °C**
Punto caldo	**38-42 °C**
Temperatura, notte	**21-26 °C**
Umidità	**30-50%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente, in coppia o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Vivipara**
Maturità sessuale	**28-36 mesi**
Piccoli per parto	**5-20 piccoli**
Deposizioni all'anno	**1**
Gestazione	**90-120 giorni**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Non valutata (NE)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Un adulto ha bisogno di un terrario di almeno 100 × 50 × 50 cm (lunghezza × larghezza × altezza).
TEMPERATURA	Il terrario deve avere un gradiente ben definito. L'aria deve essere a 27-31 °C di giorno e il punto di insolazione deve avere 38-42 °C in superficie, misurati con un termometro a infrarossi.
UMIDITÀ E ACQUA	L'aria deve essere da asciutta a moderatamente umida: 30-50 %. La specie si trova male in aria umida e stagnante, quindi la ventilazione deve essere buona. Metti una ciotola bassa e stabile con acqua fresca e cambiala ogni giorno.
ILLUMINAZIONE E UVB	*Sceloporus cyanogenys* è diurna e prende il sole in pieno sole, perciò ha bisogno di luce intensa e UVB.
ALIMENTAZIONE	*Sceloporus cyanogenys* si nutre di insetti. Offri una dieta varia di insetti vivi: grilli, piccole blatte, camole della farina, larve di zophobas, bachi da seta e larve della tarma della cera (queste ultime con parsimonia).
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	L'animale è veloce e schivo e si difende mordendo e fuggendo. È un animale da osservare, non da maneggiare. Se deve essere preso in mano, sostienilo per il corpo dal collo alla cloaca.
AREALE D'ORIGINE	Stati Uniti, Messico e Guatemala.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/iguane/sceloporus-cyanogenys