herpy

IGUANE

Desert Spiny Lizard

Sceloporus magister

Sceloporus magister è una lucertola robusta e spinosa dei deserti degli Stati Uniti sud-occidentali e del Messico nord-occidentale. È diurna, si arrampica su alberi, arbusti e rocce e si nutre di insetti. Il maschio ha macchie blu sulla gola e sul ventre. Richiede un terrario ampio e asciutto con UVB intensi, un punto di termoregolazione molto caldo e un riposo invernale fresco. La femmina depone uova.

Famiglia: Phrynosomatidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**20-30 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**5-8 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo, rupicolo e terrestre**
Habitat	**Deserto e terreno roccioso**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**120 × 50 × 50 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**27-32 °C**
Punto caldo	**38-42 °C**
Temperatura, notte	**16-22 °C**
Umidità	**20-40%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Riposo invernale	**9-12 °C** 8-12 settimane
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**12-24 mesi**
Uova per deposizione	**4-24 uova**
Deposizioni all'anno	**1-2**
Incubazione	**60-80 giorni** a 27-30 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si conosce poco della gestione specifica di *Sceloporus magister*, e le indicazioni si basano sul clima desertico e sulle conoscenze relative al genere.
TEMPERATURA	L'aria deve essere a 27-32 °C di giorno. Il punto di termoregolazione deve avere 38-42 °C in superficie, misurati con un termometro a infrarossi.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità deve essere bassa, intorno al 20-40 %. Il terrario deve essere asciutto e ben ventilato. Metti una ciotola bassa con acqua fresca e cambia l'acqua ogni giorno.
ILLUMINAZIONE E UVB	*Sceloporus magister* è diurna e ama stare al sole, perciò richiede UVB intensi. Usa un tubo T5 HO (zona 3 di Ferguson) in un riflettore sopra il punto di termoregolazione.
ALIMENTAZIONE	La specie è insettivora. Offri insetti vivi variati: grilli, blatte, cavallette, tarme della farina, zophobas, bachi da seta e larve della cera. Le prede non devono essere più grandi della testa dell'animale.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	L'animale è attento, veloce e territoriale, e la manipolazione lo stressa. Limita la manipolazione al minimo e non afferrare mai la coda, perché può staccarsi.
AREALE D'ORIGINE	Stati Uniti e Messico.