herpy

IGUANE

Western fence lizard

Sceloporus occidentalis

Sceloporus occidentalis è una lucertola piccola, veloce e dalle scaglie ruvide, originaria degli Stati Uniti occidentali, che si posa su rocce, tronchi e recinzioni in pieno sole. Il maschio ha macchie blu sul ventre e sulla gola, che mostra con le flessioni sulle zampe anteriori. La specie raggiunge circa 21 cm, è diurna e si nutre di insetti. Richiede un punto di insolazione potente, UVB, un terrario spazioso e un coperchio ben chiuso.

Famiglia: Phrynosomatidae Nome precedente: *Sceloporus longipes; Sceloporus smaragdinus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**14-23 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**4-5 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo, rupicolo e terrestre**
Habitat	**Terreno roccioso e bosco e prato temperati**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**80 × 40 × 40 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**27-28 °C**
Punto caldo	**38-42 °C**
Temperatura, notte	**18-24 °C**
Umidità	**30-50%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Riposo invernale	**8-12 °C** 8-12 settimane
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente, in coppia o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**12-24 mesi**
Uova per deposizione	**3-17 uova**
Deposizioni all'anno	**1-3**
Incubazione	**55-65 giorni** a 27-30 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sulla gestione di *Sceloporus occidentalis* in particolare, perciò le indicazioni si basano sulle esigenze condivise dalle piccole specie eliofile del genere.
TEMPERATURA	Di giorno la temperatura deve essere di 27-28 °C. Direttamente sotto una lampada riscaldante deve esserci un punto di insolazione di 38-42 °C, misurato sulla superficie con un termometro a infrarossi.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere moderata, circa 30-50 %. La specie vive in zone aperte e soleggiate e non tollera un'umidità costante e vaporosa, ma il substrato non deve nemmeno essere completamente secco.
ILLUMINAZIONE E UVB	*Sceloporus occidentalis* è diurna ed eliofila e ha bisogno di luce intensa e UVB tutto l'anno. Usa un tubo UVB (zona 3 di Ferguson) o una lampada a ioduri metallici UVB combinata sopra il punto di insolazione.
ALIMENTAZIONE	*Sceloporus occidentalis* è insettivora. In natura mangia grilli, ragni, zecche, scorpioni, formiche e coleotteri e ogni tanto una lucertola più piccola.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Sceloporus occidentalis* è guardinga, veloce e territoriale. I maschi si mettono in mostra con flessioni sulle zampe anteriori, cenni del capo e corpo gonfiato.
AREALE D'ORIGINE	Stati Uniti e Messico.