herpy

LACERTIDI

Argentine Black and White Tegu

Salvator merianae

Salvator merianae è il più grande dei tegu: una lucertola robusta, intelligente e diurna dell'America meridionale orientale e centrale, con bande nere e bianche. I maschi raggiungono fino a 150 cm e pesano diversi chili. La specie richiede un terrario costruito su misura di almeno 300 × 150 × 150 cm, un substrato profondo e umido in cui scavare, calore intenso e UVB, e vive 15-20 anni. In natura trascorre 4-6 mesi all'anno in letargo.

Famiglia: Teiidae Nome precedente: *Tupinambis merianae*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**80-150 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**2.500-8.000 g**
Aspettativa di vita	**15-20 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre e scavatore**
Habitat	**Savana, foresta secca e foresta pluviale**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**300 × 150 × 150 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**24-35 °C**
Punto caldo	**52-57 °C**
Temperatura, notte	**20-23 °C**
Umidità	**70-80%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Riposo invernale	**15-20 °C** 17-22 settimane
Alimentazione	**Insetti, frutta, piante, vertebrati e vermi/lumache**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**24-36 mesi**
Uova per deposizione	**18-25 uova**
Deposizioni all'anno	**1-2**
Incubazione	**40-75 giorni** a 29-30 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Un maschio adulto richiede un terrario di almeno 300 × 150 × 150 cm (lunghezza × larghezza × altezza), e una femmina adulta di almeno 240 × 120 × 120 cm. Terrari così grandi vanno costruiti o ordinati su misura.
TEMPERATURA	*Salvator merianae* richiede un gradiente ben definito. La zona di basking ha una temperatura superficiale di 52-57 °C, misurata con un termometro a infrarossi. Il lato caldo del terrario è a 32-35 °C e il lato fresco a 24-29 °C.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità nel terrario deve essere del 70-80 %. Mantienila bagnando il substrato fino a renderlo uniformemente umido ma non fangoso, ripetendo l'operazione ogni settimana, e nebulizzando ogni giorno.
ILLUMINAZIONE E UVB	*Salvator merianae* è diurna e richiede luce intensa e UVB per 12-14 ore al giorno.
ALIMENTAZIONE	*Salvator merianae* è onnivora e richiede un'alimentazione varia. Un adulto riceve circa il 60 % di cibo animale, il 30 % di verdura e il 10 % di frutta.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Salvator merianae* è intelligente e curiosa e può imparare a reagire al proprio nome, a risolvere piccoli compiti per arrivare al cibo e a seguire semplici comandi.
AREALE D'ORIGINE	Brasile, Uruguay, Paraguay, Bolivia e Argentina.