herpy

LACERTIDI

## Asian Grass Lizard

# *Takydromus sexlineatus*

*Takydromus sexlineatus* è una lucertola snella e diurna, dotata di una coda insolitamente lunga, che vive tra l'erba alta e la vegetazione bassa del Sud-est asiatico. Raggiunge i 20-30 cm, dei quali la maggior parte è coda, e si nutre di piccoli insetti. La specie è tropicale e non va sottoposta a svernamento, ma si disidrata in fretta e richiede un allestimento alto e fittamente piantumato, con un'umidità moderata.

Famiglia: Lacertidae

### DATI ESSENZIALI

#### L'ANIMALE

| | |
|---|---|
| Dimensioni da adulto | **20-30 cm**<br>lunghezza totale inclusa la coda |
| Aspettativa di vita | **5-7 anni** |
| Attività | **Di giorno** |
| Stile di vita | **Arboricolo e terrestre** |
| Habitat | **Savana** |
| Difficoltà | **Intermedio** |

#### CURA

| | |
|---|---|
| Terrario min. | **60 × 40 × 60 cm**<br>L × P × H per 2 adulti |
| Temperatura, giorno | **25-30 °C** |
| Punto caldo | **34-40 °C** |
| Temperatura, notte | **20-23 °C** |
| Umidità | **60-70%** |
| Acqua | **Ciotola d'acqua** |
| UVB | **Consigliati**<br>Zona Ferguson 2 |
| Alimentazione | **Insetti** |
| Detenzione | **In coppia o un maschio con più femmine** |

#### RIPRODUZIONE

| | |
|---|---|
| Riproduzione | **Ovipara** |
| Uova per deposizione | **1-4 uova** |
| Deposizioni all'anno | **2-5** |
| Incubazione | **40 giorni**<br>a 26 °C |

#### TUTELA E DOCUMENTI

| | |
|---|---|
| CITES | **Non elencata** |
| Allegato UE | **Non elencata** |
| IUCN | **Minima preoccupazione (LC)** |

## La cura in breve

| | |
|---|---|
| **IL TERRARIO** | Un piccolo terrario di vetro è troppo poco per *Takydromus sexlineatus*, anche se l'animale è piccolo. |
| **TEMPERATURA** | Il gradiente è la cosa più importante. La temperatura diurna è di 25-30 °C, e nel punto di basking la superficie raggiunge 34-40 °C, misurati con un termometro a infrarossi. |
| **UMIDITÀ E ACQUA** | L'umidità dell'aria deve essere del 60-70 %. Nebulizza il terrario con acqua due volte al giorno, in modo che gli animali possano bere le gocce dalle foglie e dalle pareti e che l'umidità resti alta. |
| **ILLUMINAZIONE E UVB** | *Takydromus sexlineatus* è diurno. Il terrario deve avere un piccolo faretto riscaldante e una luce UVB. |
| **ALIMENTAZIONE** | *Takydromus sexlineatus* è insettivoro e accetta piccoli insetti vivi. |
| **COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE** | *Takydromus sexlineatus* è veloce, timido e adatto all'osservazione. |
| **AREALE D'ORIGINE** | India, Cina, Myanmar (Birmania), Thailandia, Laos, Cambogia, Vietnam, Malaysia e Indonesia. |