herpy

RANE FRECCIA

Brazil-nut Poison Frog

Adelphobates castaneoticus

Adelphobates castaneoticus è una piccola rana freccia velenosa di colore nero lucido, con macchie bianche o giallastre e vivaci macchie arancioni sugli arti anteriori e sulle ginocchia. Vive sul suolo della foresta nello stato del Pará, nell'Amazzonia brasiliana, e prende il nome dalla noce del Brasile, i cui gusci vuoti il maschio usa come vasche d'acqua per i girini. Si sa poco sulla sua gestione.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Dendrobates castaneoticus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**18-23 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**8-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 45 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**24-27 °C**
Temperatura, notte	**20-24 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Maturità sessuale	**5-7 mesi**
Uova per deposizione	**4-8**
Schiusa	**10-14 giorni**
Periodo larvale	**60-90 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e altri girini**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sulla gestione di *Adelphobates castaneoticus*. La specie vive nella lettiera del suolo forestale, in un clima di pianura caldo e umido.
TEMPERATURA	La temperatura diurna deve essere di 24-27 °C e di notte scende di 3-4 °C, a 20-24 °C. La variazione nel corso dell'anno deve essere ridotta, 1-2 °C. Ciò corrisponde al clima di pianura del Pará.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità deve essere di circa 70-80 % a metà giornata e vicina al 100 % al mattino e alla sera, e la lettiera e il substrato devono restare sempre umidi.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Una ciotola d'acqua non è necessaria, a meno che si voglia far riprodurre gli animali. Le rane ricevono l'umidità dalla nebulizzazione e dalle foglie umide.
ILLUMINAZIONE E UVB	Offri 10-12 ore di luce al giorno con tubi fluorescenti o LED per le piante. In natura la specie vive all'ombra sotto le chiome della foresta, quindi la luce deve bastare alle piante per crescere senza riscaldare il terrario.
ALIMENTAZIONE	In natura *A. castaneoticus* si nutre di formiche, termiti e altri piccoli artropodi. In cattività si somministrano collemboli, piccoli moscerini della frutta e piccoli isopodi.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*A. castaneoticus* è diurna e vive soprattutto sul suolo della foresta.
AREALE D'ORIGINE	Brasile.