herpy

RANE FRECCIA

Rio Madeira Poison Frog

Adelphobates quinquevittatus

Adelphobates quinquevittatus è una rana dardo velenosa molto piccola, di un nero lucido come laccato, lunga 14-16 mm, con strisce bianche e zampe grigie, verdastre o arancioni. Vive nella lettiera di foglie della foresta pluviale nel bacino del Rio Madeira, nell'Amazzonia meridionale, e viene allevata solo di rado. Si conosce pochissimo sulla sua gestione.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Dendrobates quinquevittatus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**14-16 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**8-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 45 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**24-27 °C**
Temperatura, notte	**20-24 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**4-8**
Schiusa	**10-14 giorni**
Periodo larvale	**60-90 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e altri girini**
Cure parentali	**Trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa pochissimo sulla gestione di *Adelphobates quinquevittatus*. La specie vive nella lettiera di foglie in un clima di pianura caldo e umido.
TEMPERATURA	La temperatura diurna deve essere di 24-27 °C e di notte scende di 3-4 °C, fino a 20-24 °C. La variazione nel corso dell'anno deve essere piccola, 1-2 °C. Ciò corrisponde al clima di pianura del Rondônia.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere di circa 70-80 % a metà giornata e vicina al 100 % al mattino e alla sera, e lo strato di foglie e il substrato devono restare sempre umidi.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Una ciotola d'acqua non è necessaria, a meno che non si voglia ottenere una nidiata. Le rane ricevono l'umidità dalla nebulizzazione e dalle foglie umide.
ILLUMINAZIONE E UVB	Offri 10-12 ore di luce al giorno con tubi fluorescenti o LED per le piante. In natura la specie vive all'ombra sotto le chiome della foresta, quindi la luce deve bastare alle piante per crescere senza riscaldare il terrario.
ALIMENTAZIONE	In natura *A. quinquevittatus* si nutre soprattutto di formiche e termiti.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*A. quinquevittatus* è diurna e vive soprattutto nella lettiera di foglie. Temperamento e comportamento territoriale non sono documentati.
AREALE D'ORIGINE	Brasile.