herpy

RANE FRECCIA

Brilliant-thighed Poison Frog

Allobates femoralis

Allobates femoralis è una piccola rana scura di 3-4 cm originaria dell'Amazzonia e dello Scudo della Guyana, con una macchia giallo-arancio dietro il braccio e una macchia arancione a mezzaluna sulla coscia. È diurna e terricola; i maschi difendono il territorio con un richiamo acuto e il corteggiamento è uno dei più lunghi tra le rane dardo. La specie appartiene alla famiglia Aromobatidae ed è considerata non velenosa.

Famiglia: Aromobatidae Nome precedente: *Epipedobates femoralis; Phyllobates femoralis; Dendrobates femoralis*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**3-4 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee	**Nessuna nota**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**60 × 40 × 40 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**25-28 °C**
Temperatura, notte	**21-24 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**8-20**
Schiusa	**15-20 giorni**
Periodo larvale	**40-50 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Una coppia di *Allobates femoralis* richiede un terrario di vetro di almeno 60 × 40 × 40 cm. La specie vive al suolo, quindi conta soprattutto la superficie del fondo, ma i maschi si arrampicano volentieri un po' per cantare.
TEMPERATURA	Di giorno la temperatura deve essere di 25-28 °C e di notte di 21-24 °C, cioè 3-4 gradi in meno. Questa escursione giornaliera corrisponde alle condizioni della Guyana francese e favorisce la riproduzione.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità deve essere alta: 70-80 % a metà giornata e fino al 100 % al mattino e alla sera.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Offri una ciotola di vetro bassa, di circa 10 cm di diametro, con 1-2 cm d'acqua, da cui le rane possano uscire facilmente. La usa anche il maschio per deporre i girini.
ILLUMINAZIONE E UVB	La luce serve soprattutto alle piante. Offri 12 ore di luce al giorno, ad esempio dalle 7 alle 19. Tubi fluorescenti o LED da circa 6.500 K danno colori naturali e una buona crescita delle piante.
ALIMENTAZIONE	*Allobates femoralis* si nutre di piccoli insetti.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Allobates femoralis* è diurna e i maschi sono territoriali.
AREALE D'ORIGINE	Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Guyana Francese, Guyana, Perù e Suriname.