herpy

RANE FRECCIA

Sanguine Poison Frog

Allobates zaparo

Allobates zaparo è una piccola rana diurna di circa 3 cm, originaria della foresta pluviale ai piedi delle Ande, in Ecuador e nel Perù settentrionale. Gli adulti hanno il dorso rosso, i fianchi neri, il ventre blu e macchie gialle vicino alle zampe, e imitano le velenose *Ameerega bilinguis* e *Ameerega parvula*, pur non essendo velenosi. La specie viene allevata raramente, quindi le indicazioni di gestione si basano sul clima e sulla specie affine *Allobates femoralis*.

Famiglia: Aromobatidae Nome precedente: *Epipedobates zaparo; Phyllobates zaparo; Dendrobates zaparo*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**3 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee	**Nessuna nota**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**60 × 40 × 40 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**24-27 °C**
Temperatura, notte	**21-23 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**8-20**
Schiusa	**15-20 giorni**
Periodo larvale	**40-50 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sulla gestione di *Allobates zaparo*. La specie viene allevata raramente e la riproduzione in cattività non è descritta.
TEMPERATURA	Mantieni il terrario a 24-27 °C di giorno e a 21-23 °C di notte. I valori seguono il clima della pianura ecuadoriana ai piedi delle Ande. L'escursione nel corso dell'anno deve essere ridotta, 1-2 °C. Non c'è riposo invernale.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 70-80 % a metà giornata e vicina al 100 % al mattino e alla sera.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Offri una ciotola di vetro bassa con 1-2 cm di acqua, da cui le rane possano uscire facilmente. La ciotola viene usata dagli adulti quando devono depositare i girini.
ILLUMINAZIONE E UVB	La luce serve soprattutto alle piante: 10-12 ore al giorno con luce LED a spettro adatto alle piante. Non è dimostrato che *Allobates zaparo* abbia bisogno di UVB.
ALIMENTAZIONE	In natura le formiche sono una parte importante della dieta.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Allobates zaparo* è diurna e vive sulla lettiera di foglie.
AREALE D'ORIGINE	Ecuador e Perù.