herpy

RANE FRECCIA

Pleasing Poison Frog

Ameerega bassleri

Ameerega bassleri è una rana dardo velenosa diurna di poco meno di 4 cm, originaria delle foreste umide ai piedi orientali delle Ande, nel Perù settentrionale. Il maschio si occupa delle uova e trasporta i girini fino all'acqua; la specie va tenuta a temperature più fresche rispetto alla maggior parte delle rane dardo velenose. Si sa poco sulla sua gestione e in natura è una specie vulnerabile.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Epipedobates bassleri; Dendrobates bassleri; Phobobates bassleri*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**4 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**8-12 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale e foresta montana**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**50 × 50 × 55 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**18-21 °C**
Temperatura, notte	**13-17 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti e piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Nelle ascelle fogliari (ad es. bromelie)**
Maturità sessuale	**12-13 mesi**
Uova per deposizione	**40**
Schiusa	**10 giorni**
Periodo larvale	**50-60 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Vulnerabile (VU)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sulla gestione di *Ameerega bassleri*. La specie vive nella foresta umida lungo i ruscelli, tra 300 e 1.200 m di altitudine, dove l'aria è più fresca che per la maggior parte delle rane dardo velenose.
TEMPERATURA	La specie non va tenuta troppo calda. Di giorno vanno bene 18-21 °C, e di notte la temperatura deve scendere di 4-6 °C, a circa 13-17 °C. La differenza tra le stagioni è di soli 1-2 °C.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità deve essere del 70-100 %. Al mattino e alla sera è vicina al 100 %, con nebbia, mentre a metà giornata può scendere a circa il 70 %.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Nel terrario deve esserci una ciotola con 1-2 cm di acqua; per i girini, in caso di riproduzione, si usano una zona d'acqua fissa o piccoli contenitori. Usa acqua piovana o acqua da osmosi e cambiala più volte a settimana.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie vive sul suolo della foresta, dove arriva poca luce. Basta una luce LED con spettro adatto alle piante e un fotoperiodo di 10-12 ore.
ALIMENTAZIONE	La specie accetta i comuni piccoli insetti da alimentazione: moscerini della frutta, collemboli, grilli appena nati, le larve più piccole della tarma della cera e piccoli insetti raccolti nei prati con il retino.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è diurna e vive sul terreno. Il maschio è territoriale e canta per difendere la propria area, quindi gli animali devono avere molti nascondigli e linee visive interrotte.
AREALE D'ORIGINE	Perù.