herpy

RANE FRECCIA

Ecuador Poison Frog

Ameerega bilinguis

Ameerega bilinguis è una piccola rana dardo velenosa diurna di 17-23 mm, che vive nella lettiera di foglie della foresta pluviale nella pianura amazzonica nordoccidentale. Il dorso è nero con tubercoli rossi, mentre il ventre è azzurro chiaro con disegni neri. La specie viene allevata raramente e le conoscenze sulla sua gestione sono scarse.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Epipedobates bilinguis*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**17-23 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**40 × 40 × 40 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**25-26 °C**
Temperatura, notte	**20-22 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**4-16**
Schiusa	**10-22 giorni**
Periodo larvale	**70-90 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Le conoscenze sulla gestione di *Ameerega bilinguis* sono scarse, ma la specie viene allevata in piccoli numeri e i parametri di base per il terrario sono noti.
TEMPERATURA	La temperatura diurna è di 25-26 °C e di notte viene abbassata di 4-5 gradi, a 20-22 °C.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere vicina al 100 % al mattino e alla sera, possibilmente con nebbia, e può scendere al 70-80 % durante il giorno.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Una ciotola d'acqua bassa con 1-2 cm di acqua permette alle rane di bere ed è necessaria se si vuole ottenere la riproduzione, perché il maschio deposita lì i girini.
ILLUMINAZIONE E UVB	La luce deve soprattutto garantire alle piante un ritmo giorno-notte di circa 12 ore, e a questo scopo basta una lampada LED per piante. I raggi UVB non sono necessari per le rane dardo velenose, quindi sono facoltativi.
ALIMENTAZIONE	Il cibo è composto da piccoli artropodi vivi: collemboli e moscerini della frutta (*Drosophila melanogaster*), microgrilli, plancton di prato setacciato e piccoli isopodi.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è diurna e vive soprattutto a terra, ma i maschi si arrampicano volentieri su punti leggermente rialzati per cantare.
AREALE D'ORIGINE	Colombia, Ecuador e Perù.