herpy

RANE FRECCIA

Cainarachi Poison Frog

Ameerega cainarachi

Ameerega cainarachi è una rana velenosa dal dorso rosso di circa 3 cm, conosciuta solo nella fascia pedemontana intorno a Tarapoto, nel nord del Perù. La specie è minacciata in natura e le conoscenze sulla sua gestione sono scarse, perciò questa guida si basa sul clima, sull'habitat e sulle specie affini *Ameerega bassleri* e *Ameerega pepperi*.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Epipedobates cainarachi; Epipedobates ardens*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**3 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**40 × 40 × 40 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**22-26 °C**
Temperatura, notte	**19-22 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti e piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Maturità sessuale	**12-13 mesi**
Uova per deposizione	**22-44**
Schiusa	**10 giorni**
Periodo larvale	**50-60 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**In pericolo (EN)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Le conoscenze sulla gestione di *Ameerega cainarachi* sono scarse. La specie vive nella stessa area di *Ameerega bassleri* e *Ameerega pepperi*, e i dati per la riproduzione sono ripresi da queste (vedi Riproduzione).
TEMPERATURA	Di giorno vanno bene 22-26 °C, mentre di notte la temperatura deve scendere fino a 5 °C, a circa 19-22 °C. La differenza tra le stagioni è di soli 1-2 °C. Non c'è riposo invernale.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 70-100 %: circa 70 % a metà giornata e vicina al 100 % con la nebbia al mattino e alla sera. Nebulizza oppure usa l'impianto di pioggia e il nebulizzatore un paio di volte al giorno.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Basta una ciotola bassa con 1-2 cm di acqua, facile da raggiungere e da lasciare. Usa acqua piovana, acqua osmotica o acqua del rubinetto declorata e cambiala ogni due giorni per evitare la proliferazione di batteri.
ILLUMINAZIONE E UVB	L'illuminazione deve soprattutto soddisfare le esigenze delle piante: luce LED per la crescita vegetale per 10-12 ore al giorno, con una notte ben definita.
ALIMENTAZIONE	Le rane accettano i comuni piccoli insetti da alimentazione: moscerini della frutta (*Drosophila melanogaster* e *Drosophila hydei*), collemboli, piccoli isopodi, grilli appena nati, le larve più piccole di tarma della cera e piccoli insetti raccolti a retino nei prati.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Ameerega cainarachi* è diurna e vive sul suolo della foresta. I maschi del genere sono territoriali e cantano da postazioni fisse.
AREALE D'ORIGINE	Perù.