herpy

RANE FRECCIA

Yurimaguas Poison Frog

Ameerega hahneli

Ameerega hahneli è una piccola rana velenosa diurna di 17-22 mm, con strisce laterali chiare e ventre blu, che vive nella lettiera di foglie della foresta pluviale in gran parte della pianura amazzonica. Il maschio trasporta i girini fino ad acqua corrente, e i girini hanno bisogno di corrente nell'acqua. La specie è comune in natura, ma rara in cattività.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Epipedobates hahneli; Dendrobates hahneli*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**17-22 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**6-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**50 × 50 × 50 cm** L × P × H per 4 adulti
Temperatura, giorno	**23-25 °C**
Temperatura, notte	**19-21 °C**
Umidità	**65-90%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti e piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Maturità sessuale	**7-12 mesi**
Uova per deposizione	**6-33**
Schiusa	**4-16 giorni**
Periodo larvale	**55-65 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si hanno solo conoscenze limitate sulla gestione di *Ameerega hahneli*, e le esigenze possono variare tra le diverse forme e le possibili specie nascoste.
TEMPERATURA	*Ameerega hahneli* richiede 23-25 °C di giorno e 19-21 °C di notte. Tubi fluorescenti posti all'esterno del terrario possono fornire sia luce sia il calore necessario.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 65-90 %.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Deve sempre esserci un po' d'acqua a disposizione, ad es. nella canaletta di drenaggio o in una ciotola bassa con 1-2 cm di acqua.
ILLUMINAZIONE E UVB	L'illuminazione può essere con tubi fluorescenti o LED con spettro adatto alle piante per 10-12 ore.
ALIMENTAZIONE	Il piccolo moscerino della frutta (*Drosophila melanogaster*) è l'alimento principale. Gli adulti accettano anche il moscerino della frutta grande (*Drosophila hydei*), ma spesso lo ignorano perché è un po' troppo grande.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è diurna e vive a terra, ma è più attiva al mattino presto e a fine pomeriggio e la sera; per il resto della giornata è più timida.
AREALE D'ORIGINE	Brasile, Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana Francese e Suriname.