herpy

RANE FRECCIA

Manu Poison Frog

Ameerega macero

Ameerega macero è una piccola rana dardo diurna di 24-30 mm delle foreste pluviali attorno a Manu, nel Perù sudorientale e nel Brasile occidentale. Testa e dorso sono di un rosso vivo, i fianchi neri con una striscia gialla, e il ventre è blu con un disegno reticolare nero. La specie è allevata raramente e si sa poco sulla sua gestione.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Epipedobates macero*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**2-3 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale e foresta montana**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 45 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**25-28 °C**
Temperatura, notte	**21-25 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**4-16**
Schiusa	**10-22 giorni**
Periodo larvale	**70-90 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO
Si sa poco sull'allevamento di *Ameerega macero*. La specie si gestisce come la più o meno altrettanto grande *Ameerega petersi*, con cui è stata a lungo confusa, e i valori per il terrario e il clima sono ripresi da quest'ultima.

TEMPERATURA
La temperatura diurna è di 25-28 °C, e di notte scende di 3-4 gradi, a 21-25 °C. Gli animali provenienti dalle zone più alte dell'areale tollerano notti più fresche, e il limite inferiore dell'intervallo è il più adatto.

UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE
L'umidità dell'aria deve restare tra il 70 e il 100 %: vicina al 100 % mattina e sera, meglio se con nebbia, e intorno al 70-80 % a metà giornata.

ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA
Basta una ciotola bassa con 1-2 cm di acqua. La ciotola deve essere così bassa che un giovane possa uscirne, e avere sassi o muschio sul bordo. Cambia spesso l'acqua e pulisci la ciotola con acqua calda senza sapone.

ILLUMINAZIONE E UVB
Fornisci una luce LED con spettro adatto alle piante per 10-12 ore al giorno. I raggi UVB non sono necessari per le rane dardo; una debole luce UVB (zona Ferguson 1) è facoltativa.

ALIMENTAZIONE
In natura la rana mangia formiche, coleotteri e piccole larve di 2-7 mm.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE
I maschi cantano dal suolo o da tronchi bassi e probabilmente difendono piccoli territori, come fanno le specie affini. In natura possono vivere circa dieci adulti per 1.000 m² lungo un ruscello.

AREALE D'ORIGINE
Perù e Brasile.