herpy

RANE FRECCIA

Peru Poison Frog

Ameerega petersi

Ameerega petersi è una piccola rana freccia diurna di 24-30 mm della foresta pluviale ai piedi delle Ande, nel Perù orientale e nel Brasile occidentale. Il dorso è marrone con una chiara striscia laterale obliqua. La specie è allevata raramente e si sa poco sulla sua gestione.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Epipedobates petersi; Dendrobates petersi*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**2-3 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 45 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**25-28 °C**
Temperatura, notte	**21-25 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**4-16**
Schiusa	**10-22 giorni**
Periodo larvale	**70-90 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco della gestione di *Ameerega petersi*, ma la specie viene allevata in piccoli numeri e i parametri di base del terrario sono noti.
TEMPERATURA	La temperatura diurna è di 25-28 °C e di notte scende di 3-4 gradi, a 21-25 °C. L'escursione nel corso dell'anno è di soli 1-2 gradi.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 70-100 %: vicina al 100 % al mattino e alla sera, possibilmente con nebbia, e intorno al 70-80 % a metà giornata.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Basta una ciotola bassa con 1-2 cm di acqua. La ciotola deve essere così bassa che un giovane possa uscirne, e avere sassi o muschio sul bordo. Cambia spesso l'acqua e pulisci la ciotola con acqua calda senza sapone.
ILLUMINAZIONE E UVB	Fornisci una luce LED con spettro adatto alle piante per 10-12 ore al giorno. I raggi UVB non sono necessari per le rane freccia; una luce UVB debole (zona 1 di Ferguson) è facoltativa.
ALIMENTAZIONE	L'alimentazione consiste in piccoli artropodi vivi della lettiera di foglie.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	I maschi del genere emettono richiami e difendono piccoli territori. Non è descritto come *Ameerega petersi* si comporti in gruppo, quindi la coppia è la soluzione di allevamento più sicura.
AREALE D'ORIGINE	Perù e Brasile.