herpy

RANE FRECCIA

Spot-legged Poison Frog

Ameerega picta

Ameerega picta è una piccola rana dardo velenosa diurna, con dorso marrone scuro, fianchi neri con strisce chiare e macchie da gialle a rosse sulle cosce. Vive sul suolo della foresta, dalle pianure amazzoniche fino alle pendici delle Ande in Bolivia, Perù, Colombia e Brasile, con una popolazione isolata in Venezuela. La specie è allevata solo di rado, quindi le indicazioni di gestione si basano sul clima dell'areale e su specie affini.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Epipedobates pictus; Dendrobates pictus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**22-28 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**8-12 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale e foresta montana**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**60 × 40 × 40 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**21-25 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**15-40**
Schiusa	**15-22 giorni**
Periodo larvale	**40-90 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sulla gestione di *Ameerega picta*. La specie è allevata solo di rado e la grande estensione altitudinale rende difficile stabilire a quale clima sia adattata ciascuna popolazione.
TEMPERATURA	Mantieni il terrario a 21-25 °C di giorno e lascia scendere la temperatura di 3-4 °C di notte, a 18-22 °C. L'escursione nel corso dell'anno deve essere ridotta, 1-2 °C.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 70-80 % a metà giornata e vicina al 100 % al mattino e alla sera.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Offri una ciotola d'acqua bassa con 1-2 cm d'acqua, in modo che le rane possano uscirne facilmente, con sassi o muschio sul bordo. La ciotola è usata dagli adulti quando devono depositare i girini.
ILLUMINAZIONE E UVB	La luce serve soprattutto alle piante: 10-12 ore al giorno con luce LED a spettro adatto alle piante. Non è documentato che *Ameerega picta* abbia bisogno di UVB.
ALIMENTAZIONE	In natura la rana si nutre di piccoli artropodi.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Ameerega picta* è diurna e vive soprattutto a terra. I maschi del genere difendono piccoli territori, quindi la coppia è la sistemazione più sicura. Non tenere due maschi insieme in un terrario piccolo.
AREALE D'ORIGINE	Bolivia, Brasile, Perù, Colombia e Venezuela.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/rane-freccia/ameerega-picta