herpy

RANE FRECCIA

Cordillera Azul Poison Frog

Ameerega rubriventris

Ameerega rubriventris è una piccola rana velenosa scura, di 21-25 mm, con strisce laterali chiare e il ventre marmorizzato di rosso-nero o arancione-nero. Vive solo nelle foreste della Cordillera Azul, nel Perù centrale, ed è minacciata. È una specie allevata raramente e le conoscenze sulla sua gestione sono scarse.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Epipedobates rubriventris*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**21-25 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**50 × 50 × 50 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**25-28 °C**
Temperatura, notte	**21-25 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**4-16**
Schiusa	**10-22 giorni**
Periodo larvale	**70-90 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**In pericolo (EN)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sulla gestione di *Ameerega rubriventris*.
TEMPERATURA	La temperatura diurna è di 25-28 °C, e di notte si abbassa di 3-4 gradi, a 21-25 °C. La temperatura varia solo di 1-2 gradi nel corso dell'anno e un riposo invernale non è necessario.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 70-80 % di giorno e vicina al 100 % al mattino e alla sera, possibilmente con nebbia.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Basta una ciotola d'acqua bassa con 1-2 cm d'acqua, facile da raggiungere e da lasciare. Usa acqua piovana, acqua da osmosi o acqua di rubinetto declorata, e cambia l'acqua a giorni alterni per evitare la proliferazione di batteri.
ILLUMINAZIONE E UVB	La luce deve servire soprattutto alle piante: una lampada LED per la crescita delle piante per 10-12 ore al giorno e una notte ben definita.
ALIMENTAZIONE	Le rane mangiano piccoli artropodi vivi: moscerini della frutta (*Drosophila melanogaster* e, per gli adulti, anche *D. hydei*), collemboli, microgrilli, piccoli isopodi e plancton di prato setacciato.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Ameerega rubriventris* è diurna e vive sul suolo della foresta, ma si arrampica volentieri. Il maschio emette un richiamo simile a un cinguettio, per lo più 2-3 brevi fischi di seguito.
AREALE D'ORIGINE	Perù.