herpy

RANE FRECCIA

Silverstone's Poison Frog

Ameerega silverstonei

Ameerega silverstonei è una rana velenosa rosso-arancione di circa 4 cm, nota solo della Cordillera Azul, sui versanti orientali delle Ande in Perù. Vive in foreste montane fresche a circa 1.300-1.500 m di altitudine, è minacciata dalla perdita dell'habitat e viene allevata raramente. La sua gestione richiede un terrario fresco.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Epipedobates silverstonei; Dendrobates silverstonei; Phobobates silverstonei*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**4-5 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**8-12 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta montana**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**50 × 50 × 50 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**20-24 °C**
Temperatura, notte	**17-20 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti e piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Maturità sessuale	**15-16 mesi**
Uova per deposizione	**30-45**
Schiusa	**30 giorni**
Periodo larvale	**55-60 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**In pericolo (EN)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sulla gestione di *Ameerega silverstonei*. Le indicazioni si basano sul clima della foresta montana a circa 1.300-1.500 m: fresco, umido e stabile tutto l'anno.
TEMPERATURA	Di giorno devono esserci 20-24 °C, preferibilmente verso il limite inferiore, e di notte 17-20 °C. La temperatura non deve superare i 25 °C. L'aria fresca non è un problema, finché le oscillazioni sono ridotte.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 70-100 %: circa il 70 % a metà giornata e fino al 100 % al mattino e alla sera.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Basta una ciotola bassa con 1-2 cm d'acqua. Usa acqua piovana, acqua osmotizzata o acqua declorata e cambiala spesso. L'acqua deve essere fresca come l'aria. Metti sassi o rami nella ciotola, così che i giovani possano uscirne.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie vive sul suolo ombroso della foresta, perciò la luce deve essere moderata e deve esserci ombra. Bastano tubi fluorescenti o LED con spettro adatto alle piante per 10-12 ore al giorno.
ALIMENTAZIONE	*Ameerega silverstonei* accetta prede da piccole a grandi: moscerini della frutta grandi (*Drosophila hydei*), grilli appena nati, le larve di tarma della cera più piccole e piccoli insetti catturati con il retino nei prati.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è timida e si ritira spesso sotto le foglie o la corteccia di sughero. Può essere tenuta in gruppo, ma i maschi sono territoriali, perciò tieni una coppia o un gruppo con più femmine che maschi.
AREALE D'ORIGINE	Perù.