herpy

RANE FRECCIA

Three-striped Poison Frog

Ameerega trivittata

Ameerega trivittata è una rana dendrobatide grande e diurna, lunga 4-6 cm, che vive sul suolo della foresta amazzonica. Ha una colorazione nera con due strisce laterali verde chiaro, e il maschio spesso trasporta sul dorso in un solo viaggio 15-30 girini fino all'acqua. La rana richiede un terrario più spazioso rispetto alle piccole dendrobatidi.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Epipedobates trivittatus; Dendrobates trivittatus; Phobobates trivittatus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**4-6 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale e zona umida**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**70 × 50 × 50 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**23-25 °C**
Temperatura, notte	**19-22 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Maturità sessuale	**12-24 mesi**
Uova per deposizione	**15-40**
Schiusa	**15-22 giorni**
Periodo larvale	**40-90 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Un terrario di almeno 70 × 50 × 50 cm (lunghezza, larghezza, altezza) è adatto a due *Ameerega trivittata* adulte.
TEMPERATURA	La temperatura diurna va mantenuta a 23-25 °C e di notte viene abbassata di 3-4 °C, a circa 19-22 °C. La variazione nel corso dell'anno deve essere piccola, 1-2 °C.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità deve stare all'80-90 % per gran parte della giornata, vicino al 100 % al mattino e alla sera, e può scendere a circa il 70 % a metà giornata.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Basta una ciotola d'acqua bassa con 1-2 cm d'acqua. La ciotola deve essere così bassa che un giovane possa uscirne, e con sassi o muschio sul bordo.
ILLUMINAZIONE E UVB	L'UVB non è documentato come necessario per le dendrobatidi in generale, e per questa specie non ci sono informazioni. Una luce UVB debole (zona 1 di Ferguson) è facoltativa.
ALIMENTAZIONE	L'alimentazione è composta da piccoli artropodi vivi.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	I maschi cantano a voce alta e difendono piccoli territori, mentre le femmine sono tranquille. Non è documentato come la specie si comporti in gruppo in cattività, quindi la coppia è la soluzione più sicura.
AREALE D'ORIGINE	Bolivia, Brasile, Colombia, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela.