herpy

RANE FRECCIA

Cauca Poison Frog

Andinobates bombetes

Andinobates bombetes è una piccola rana velenosa diurna di 17-19 mm, originaria delle foreste nebulose delle Ande colombiane. È di colore da nero a marrone scuro, con disegni rossi o arancioni sulla parte anteriore del corpo, e dipende da bromelie piene d'acqua. In natura la specie è vulnerabile e le conoscenze sulla sua gestione sono scarse.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Ranitomeya bombetes; Dendrobates bombetes; Minyobates bombetes*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**17-19 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta montana**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**45 × 50 × 60 cm** L × P × H per 5 adulti
Temperatura, giorno	**22-25 °C**
Temperatura, notte	**18-21 °C**
Umidità	**80-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**1-2**
Schiusa	**16-24 giorni**
Periodo larvale	**108-112 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Vulnerabile (VU)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Sulla gestione di *Andinobates bombetes* si sa poco. Le indicazioni si basano sull'habitat, una foresta montana fresca e molto umida con spessa lettiera e bromelie, e sulla riproduzione in cattività in Colombia.
TEMPERATURA	La temperatura diurna deve essere di 22-25 °C e di notte può scendere a 18-21 °C, come nella foresta montana. Mantieni la temperatura sotto i 27 °C.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere dell'80-100 % e mai inferiore al 70 %. Nebulizza due volte al giorno, mattina e pomeriggio, oppure usa un impianto di nebulizzazione o di pioggia con acqua osmotica o piovana.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Non serve una ciotola d'acqua; le rane bevono le gocce sulle piante e l'acqua nebulizzata. Per i girini si usano bromelie con acqua nelle ascelle fogliari o piccoli bicchierini di plastica con 2-3 cm d'acqua.
ILLUMINAZIONE E UVB	La luce serve soprattutto alle piante: una luce per piante per 10-12 ore al giorno regola il ritmo giornaliero e la crescita.
ALIMENTAZIONE	L'alimentazione è costituita da piccoli artropodi: collemboli, piccoli moscerini della frutta (*Drosophila melanogaster*), piccoli isopodi e grilli appena nati. I piccoli appena metamorfosati mangiano solo collemboli.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Andinobates bombetes* è diurna e resta in basso nel terrario, nella lettiera e presso le bromelie. I maschi cantano soprattutto al mattino.
AREALE D'ORIGINE	Colombia.