herpy

RANE FRECCIA

Bocas Poison Frog

Andinobates claudiae

Andinobates claudiae è stata descritta come la più piccola rana freccia velenosa: gli adulti misurano appena 13 mm circa. Vive nella lettiera di foglie della foresta di pianura di Bocas del Toro, nel Panama nordoccidentale, sia sulle isole sia sulla terraferma. La specie è minacciata e sulla sua gestione in cattività non si sa quasi nulla.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Ranitomeya claudiae*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**13 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Specialista**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 45 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**22-25 °C**
Temperatura, notte	**19-22 °C**
Umidità	**80-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**1-8**
Periodo larvale	**60-80 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Mangime completo**
Cure parentali	**Trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**In pericolo (EN)**

La cura in breve

IL TERRARIO
Sulla gestione di *Andinobates claudiae* non si sa quasi nulla. Le indicazioni si basano sull'habitat: foresta di pianura calda e umida, con pioggia per gran parte dell'anno e una spessa lettiera di foglie.

TEMPERATURA
La temperatura diurna deve essere di 22-25 °C e quella notturna di 19-22 °C.

UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE
L'umidità dell'aria deve essere dell'80-100 %. Nebulizza il terrario 1-2 volte al giorno con acqua piovana o acqua da osmosi, in modo da mantenere umide le foglie, oppure usa un impianto di pioggia con timer.

ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA
Gli adulti non hanno bisogno di una ciotola d'acqua: assorbono l'acqua attraverso la pelle dalla nebulizzazione e dalle foglie umide.

ILLUMINAZIONE E UVB
La specie è diurna e vive all'ombra sul fondo della foresta. Un'illuminazione LED di circa 12 ore al giorno basta per le piante.

ALIMENTAZIONE
Andinobates claudiae è così piccola che le prede devono essere le più piccole disponibili: collemboli, piccoli moscerini della frutta atteri (*Drosophila melanogaster*) e piccoli isopodi.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE
La specie è diurna e resta nella lettiera di foglie e vicino ai rifugi. I maschi cantano da posizioni fisse e difendono il proprio territorio, quindi la forma di mantenimento è la coppia.

AREALE D'ORIGINE
Panama.