herpy

RANE FRECCIA

Samaná Poison Frog

Andinobates daleswansoni

Andinobates daleswansoni è una piccola rana dardo velenosa diurna di 18-20 mm, con testa e parte anteriore del corpo di un rosso vivo e parte posteriore bruna. Vive solo nella foresta nebulare della Cordillera Central, a Caldas, in Colombia. La specie è minacciata e difficilmente viene allevata, quindi la gestione si basa sul clima montano fresco e umido del suo habitat.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Ranitomeya daleswansoni*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**18-20 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta montana**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 45 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**18-22 °C**
Temperatura, notte	**14-17 °C**
Umidità	**85-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**1-2**
Schiusa	**16-24 giorni**
Periodo larvale	**108-152 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**In pericolo (EN)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sulla gestione di *Andinobates daleswansoni*, e la specie difficilmente viene tenuta in cattività.
TEMPERATURA	La temperatura non è stata misurata nell'habitat della specie. 18-22 °C di giorno e 14-17 °C di notte sono adatti alla foresta nebulare a 1.800-2.500 m di altitudine.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere dell'85-100 %. Nebulizza a fondo foglie e piante una o due volte al giorno con acqua piovana o acqua da osmosi, oppure usa un impianto di nebulizzazione con timer.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	La specie non ha bisogno di una zona d'acqua. Gli animali ricavano l'umidità da foglie, piante e nebulizzazione. I girini crescono nell'acqua raccolta tra le foglie delle bromelie.
ILLUMINAZIONE E UVB	Fornisci 10-12 ore di luce al giorno con LED, in modo che le piante crescano bene. Il sottobosco della foresta nebulare è ombreggiato, quindi la luce non deve essere forte e gli animali devono poter cercare l'ombra.
ALIMENTAZIONE	*Andinobates daleswansoni* misura solo 18-20 mm e mangia piccoli artropodi come collemboli e piccoli moscerini della frutta.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è diurna e vive al suolo nella lettiera di foglie, dove usa cavità e nascondigli. Comportamento territoriale e richiami non sono documentati. Una coppia può essere tenuta insieme in un terrario di 45 × 45 × 45 cm.
AREALE D'ORIGINE	Colombia.