herpy

RANE FRECCIA

Tolima Poison Frog

Andinobates dorisswansonae

Andinobates dorisswansonae è una piccola rana velenosa diurna di 16-19 mm, nera o marrone scuro con macchie rosse, arancioni o gialle. È nota solo per un piccolo tratto di foresta nel Tolima settentrionale, in Colombia. La specie è vulnerabile e difficilmente viene allevata, quindi la gestione si basa sul clima montano fresco e umido del suo habitat.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Ranitomeya dorisswansonae*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**16-19 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta montana**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 45 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**18-22 °C**
Temperatura, notte	**14-17 °C**
Umidità	**85-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**1-2**
Schiusa	**16-24 giorni**
Periodo larvale	**108-152 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Vulnerabile (VU)**

La cura in breve

IL TERRARIO
Si sa poco sulla gestione di *Andinobates dorisswansonae*, e la specie difficilmente è allevata in cattività. La gestione si basa sull'habitat: foresta montana fresca e umida con chioma fitta, spesso strato di foglie e bromelie.

TEMPERATURA
La temperatura non è stata misurata nell'habitat della specie. 18-22 °C di giorno e 14-17 °C di notte sono adatti a una foresta a circa 1.800 m di altitudine.

UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE
L'umidità deve essere 85-100 %. Nebulizza a fondo foglie e piante una o due volte al giorno con acqua piovana o acqua osmotica, oppure usa un impianto di nebulizzazione con timer. Il substrato deve essere umido, ma non zuppo.

ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA
La specie non ha bisogno di una zona acquatica. Gli animali ricevono umidità da foglie, piante e nebulizzazione. I girini crescono nell'acqua delle cavità fogliari delle bromelie.

ILLUMINAZIONE E UVB
Fornisci 10-12 ore di luce al giorno con LED, in modo che le piante prosperino. La foresta ha una chioma fitta, quindi la luce non deve essere intensa e gli animali devono poter cercare ombra.

ALIMENTAZIONE
Andinobates dorisswansonae misura solo 16-19 mm e si nutre di piccoli artropodi, in natura soprattutto formiche.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE
La specie è diurna e vive al suolo nello strato di foglie. Il comportamento territoriale non è documentato. Una coppia può essere tenuta insieme in un terrario di 45 × 45 × 45 cm.

AREALE D'ORIGINE
Colombia.