herpy

RANE FRECCIA

Blue-bellied Poison Frog

Andinobates minutus

Andinobates minutus è una delle più piccole rane freccia, con soli 13-16 mm dal muso alla cloaca. Vive nella lettiera di foglie della foresta pluviale umida di pianura, dal Panama centrale alla costa pacifica della Colombia, e il maschio trasporta i girini nelle bromelie. La specie non viene prelevata in natura per il commercio di animali e difficilmente viene allevata, per cui le conoscenze sulla sua gestione sono scarse.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Ranitomeya minuta; Dendrobates minutus; Minyobates minutus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**13-16 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 45 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**22-25 °C**
Temperatura, notte	**19-22 °C**
Umidità	**80-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**1-8**
Periodo larvale	**60-80 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Mangime completo**
Cure parentali	**Trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Le conoscenze sulla gestione di *Andinobates minutus* sono scarse. La gestione si basa sull'habitat: foresta di pianura calda e umida, con piogge per gran parte dell'anno e un fitto strato di foglie.
TEMPERATURA	La temperatura diurna deve essere di 22-25 °C e quella notturna di 19-22 °C. La temperatura non deve superare a lungo i 27 °C e oltre i 29 °C è pericolosa, quindi il terrario non deve stare al sole né vicino a una fonte di calore.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità deve essere dell'80-100 %. Nebulizza il terrario 1-2 volte al giorno con acqua piovana o d'osmosi, in modo che le foglie restino umide, oppure usa un impianto di pioggia con timer.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Le rane adulte non hanno bisogno di una ciotola d'acqua: assorbono l'acqua attraverso la pelle dalla nebulizzazione e dalle foglie umide.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e vive all'ombra sul suolo forestale. Un'illuminazione LED di circa 12 ore al giorno basta per le piante.
ALIMENTAZIONE	In natura *Andinobates minutus* si nutre di acari, formiche, collemboli e larve di insetti.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è diurna e resta nella lettiera di foglie e vicino ai rifugi. I maschi cantano da postazioni fisse e difendono il proprio territorio, perciò la formula di allevamento è la coppia.
AREALE D'ORIGINE	Colombia e Panama.