herpy

RANE FRECCIA

Andinobates tolimensis

Andinobates tolimensis è una piccola rana dardo velenosa diurna di 17-19 mm, con dorso marrone e testa giallo-bronzo dai riflessi metallici. È nota soltanto da un piccolo lembo di foresta nebulosa nel Tolima settentrionale, in Colombia, è stata descritta solo nel 2007 e difficilmente viene allevata. Le cure si basano quindi sul clima fresco e umido di montagna del suo habitat.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Ranitomeya tolimense; Ranitomeya tolimensis*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**17-19 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta montana**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 60 cm** L × P × H per 3 adulti
Temperatura, giorno	**19-23 °C**
Temperatura, notte	**15-19 °C**
Umidità	**85-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**1-2**
Schiusa	**16-24 giorni**
Periodo larvale	**108-152 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Vulnerabile (VU)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sulla cura di *Andinobates tolimensis* e la specie difficilmente viene tenuta in cattività. Le cure si basano sull'habitat: foresta nebulosa fresca e umida con fitto strato di foglie, muschio, legno morto e bromelie.
TEMPERATURA	Mantieni 19-23 °C di giorno e 15-19 °C di notte, valori adatti a una foresta nebulosa a circa 1.800 m di altitudine.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere 85-100 % tutto l'anno e lo strato di foglie deve restare costantemente umido.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	La specie non ha bisogno di una vasca d'acqua. L'acqua si trova nelle rosette delle bromelie, dove crescono i girini, e va cambiata regolarmente perché non diventi torbida.
ILLUMINAZIONE E UVB	*A. tolimensis* vive in una foresta fitta con poca luce al suolo, perciò la luce serve soprattutto alle piante. Offri 10-12 ore di luce al giorno con LED o tubi fluorescenti e buio di notte.
ALIMENTAZIONE	Il cibo è costituito da piccoli artropodi: i collemboli e le drosofile (*Drosophila*) più piccoli e piccoli isopodi. Alimenta 3-4 volte a settimana e lascia sempre prede vive nel terrario.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	Il comportamento in cattività non è documentato. La rana vive sul suolo della foresta all'ombra e si nasconde nelle cavità tra le radici, tra le foglie e nel muschio. Il maschio canta dal suolo.
AREALE D'ORIGINE	Colombia.