herpy

RANE FRECCIA

Santander Poison Frog

Andinobates virolinensis

Andinobates virolinensis è una piccola rana velenosa diurna, lunga fino a 19 mm, con la testa e la parte anteriore del corpo rosso scarlatto e la parte posteriore marrone. Vive solo nella foresta nebulare della Cordigliera Orientale delle Ande, in Colombia. In natura la specie è vulnerabile e in cattività viene allevata di rado, quindi la gestione si basa sul clima fresco e umido di montagna del suo habitat.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Ranitomeya virolinensis; Dendrobates virolinensis; Minyobates virolinensis*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**19 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta montana**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 60 cm** L × P × H per 3 adulti
Temperatura, giorno	**19-23 °C**
Temperatura, notte	**15-19 °C**
Umidità	**85-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**1-2**
Schiusa	**16-24 giorni**
Periodo larvale	**108-152 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Vulnerabile (VU)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sulla gestione di *Andinobates virolinensis*, e la specie con ogni probabilità non viene allevata in cattività.
TEMPERATURA	La temperatura non è stata misurata nell'habitat della specie. 19-23 °C di giorno e 15-19 °C di notte sono adatti a una foresta nebulare a 1.300-2.400 m di quota.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità deve essere 85-100 % con una lettiera di foglie umida tutto l'anno.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	La specie non ha bisogno di una vasca d'acqua. L'acqua si trova nelle rosette delle bromelie, dove crescono i girini, e va cambiata con regolarità perché non diventi torbida.
ILLUMINAZIONE E UVB	*A. virolinensis* vive sul suolo della foresta, all'ombra, quindi la luce serve soprattutto alle piante. Fornisci 10-12 ore di luce al giorno con LED o tubi fluorescenti e buio di notte.
ALIMENTAZIONE	Il cibo è costituito da piccoli artropodi: collemboli e moscerini della frutta (*Drosophila*) della taglia più piccola e piccoli isopodi. Alimenta 3-4 volte a settimana e lascia sempre prede vive nel terrario.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	Il comportamento in cattività non è documentato. In natura più adulti condividono la stessa bromelia, quindi la specie probabilmente tollera la compagnia e può essere tenuta in coppia o in un piccolo gruppo.
AREALE D'ORIGINE	Colombia.