herpy

RANE FRECCIA

Marbled Poison Frog

Epipedobates boulengeri

Epipedobates boulengeri è una piccola rana velenosa diurna di circa 17-24 mm, con dorso marrone scuro e una striscia chiara continua lungo il fianco. Vive nella foresta pluviale di pianura lungo la costa del Pacifico, dalla Colombia sudoccidentale all'Ecuador nordoccidentale. La specie non viene quasi mai allevata e le conoscenze sulla sua gestione sono scarse.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Dendrobates boulengeri; Phyllobates boulengeri*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**17-24 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**8-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**40 × 40 × 40 cm** L × P × H per 3 adulti
Temperatura, giorno	**22-26 °C**
Temperatura, notte	**19-22 °C**
Umidità	**80-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**10-30**
Schiusa	**9-14 giorni**
Periodo larvale	**42-70 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Le conoscenze sulla gestione di *Epipedobates boulengeri* sono scarse e la specie non viene quasi mai allevata.
TEMPERATURA	Mantieni 22-26 °C di giorno, con zone un po' più fresche e un po' più calde nel terrario, e 19-22 °C di notte. Di norma bastano la temperatura ambiente e l'illuminazione; i tappetini riscaldanti sono superflui.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità deve essere dell'80-100 %. Nebulizza più volte al giorno o usa un impianto di pioggia, ad esempio tre volte al giorno per 20-60 secondi, se possibile integrato con un nebulizzatore.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Una ciotola d'acqua bassa con 1-2 cm d'acqua, ad esempio un sottovaso basso o mezzo guscio di noce del Brasile, offre alle rane un posto dove bere e fare il bagno ed è il sito riproduttivo quando il maschio deve deporre i girini.
ILLUMINAZIONE E UVB	La luce serve alle piante: tubi fluorescenti o barre LED per circa 12 ore al giorno. Le specie affini stanno bene senza UVB, quindi è facoltativo. Se vuoi fornirlo, resta nella zona 1 di Ferguson con molta ombra e fogliame fitto.
ALIMENTAZIONE	Le rane ricevono piccole prede vive: collemboli e moscerini della frutta (*Drosophila melanogaster*), e gli adulti prendono anche la più grande *Drosophila hydei* e grillini appena nati.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	Le specie del genere sono diurne, terricole e territoriali, e i maschi cantano da posizioni fisse. Il richiamo non è descritto più nel dettaglio per *E. boulengeri* in senso stretto.
AREALE D'ORIGINE	Colombia e Ecuador.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/rane-freccia/epipedobates-boulengeri