herpy

RANE FRECCIA

Darwin Wallace poison frog

Epipedobates darwinwallacei

Epipedobates darwinwallacei è una piccola rana velenosa nera di 13-20 mm con macchie da arancioni a gialle. Vive nella foresta montana intorno a Mindo, nell'Ecuador nord-occidentale, ed è minacciata. Dal 2024 è considerata un sinonimo di *Epipedobates espinosai*. Le conoscenze sulla sua gestione sono scarse.

Famiglia: Dendrobatidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**13-20 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**8-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale e foresta montana**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**40 × 40 × 40 cm** L × P × H per 3 adulti
Temperatura, giorno	**20-24 °C**
Temperatura, notte	**18-20 °C**
Umidità	**80-100%**
Acqua	**Parte acquatica** profondità 2-5 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**10-30**
Schiusa	**9-14 giorni**
Periodo larvale	**42-70 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**In pericolo (EN)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Le conoscenze sulla gestione di *Epipedobates darwinwallacei* sono scarse e la specie difficilmente viene allevata.
TEMPERATURA	Mantieni 20-24 °C di giorno e 18-20 °C di notte. Corrisponde all'estremità fresca dell'intervallo adatto a *Epipedobates tricolor*, che vive alla stessa quota. Di norma si ottiene con la temperatura ambiente e l'illuminazione.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità deve essere dell'80-100 %. Nebulizza più volte al giorno o usa un impianto di pioggia, ad esempio tre volte al giorno per 20-60 secondi, se possibile integrato da un nebulizzatore.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Offri una piccola zona d'acqua stabile con 2-5 cm di acqua e una leggera pendenza o rampa, così che le rane possano uscire facilmente.
ILLUMINAZIONE E UVB	La luce serve alle piante: tubi fluorescenti o barre LED per circa 12 ore al giorno. Le specie affini prosperano senza UVB, quindi è facoltativo.
ALIMENTAZIONE	Le rane ricevono piccole prede vive: collemboli e moscerini della frutta (*Drosophila melanogaster*); gli adulti accettano anche la più grande *Drosophila hydei* e grillini appena nati.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*E. darwinwallacei* è diurna e si muove allo scoperto tra erba e foglie. Il canto somiglia molto a quello delle *E. espinosai* brune di pianura. I maschi del genere sono territoriali e cantano da postazioni fisse.
AREALE D'ORIGINE	Ecuador.