herpy

RANE FRECCIA

Rio Santiago Poison Frog

Excidobates captivus

Excidobates captivus è una rana freccia velenosa molto piccola, di attività diurna, di 12-17 mm, originaria della zona di confine tra Perù ed Ecuador. È nera con macchie rosso-arancio disposte in file lungo il dorso e macchie gialle su arti e ventre, e vive sul suolo della foresta pluviale umida e della foresta montana.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Dendrobates captivus; Ranitomeya captiva; Adelphobates captivus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**12-17 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale e foresta montana**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**40 × 40 × 40 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**22-26 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**80-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**4-8**
Periodo larvale	**65-75 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Vulnerabile (VU)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sulla gestione di *Excidobates captivus*. La specie vive sul suolo di foreste da calde a temperate, costantemente umide.
TEMPERATURA	La temperatura nelle località della specie non è stata misurata. 22-26 °C di giorno e 18-22 °C di notte si collocano tra il clima della pianura e quello dei 800-1200 m di altitudine.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere dell'80-100 % e il substrato deve restare umido tutto l'anno. Nebulizza con acqua osmotica o piovana una o due volte al giorno, oppure usa un impianto di pioggia o nebbia.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Una ciotola d'acqua non è necessaria, perché le rane ricevono umidità dalla nebulizzazione e dalla lettiera umida.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie vive all'ombra sul suolo della foresta, quindi la luce deve soprattutto favorire la crescita delle piante e garantire un giorno di 12 ore. Gli UVB non sono necessari, ma sono facoltativi.
ALIMENTAZIONE	*Excidobates captivus* è così piccola da poter prendere solo insetti da pasto molto piccoli: collemboli, moscerini della frutta atteri (*Drosophila melanogaster*) e i più piccoli isopodi.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è diurna, ma si nasconde molto tra le foglie. Il maschio emette versi brevi e acuti da posizioni nascoste. Si tiene meglio in coppia, perché più animali insieme possono generare conflitti.
AREALE D'ORIGINE	Perù e Ecuador.