herpy

RANE FRECCIA

Marañón Poison Frog

Excidobates mysteriosus

Excidobates mysteriosus è una piccola rana dardo velenosa diurna, di circa 3 cm, originaria della Cordillera del Cóndor, nel Perù settentrionale. È nera con puntini bianchi, si riproduce in bromelie piene d'acqua nella foresta montana primaria ed è minacciata in natura.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Dendrobates mysteriosus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**3 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale e foresta montana**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 60 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**21-25 °C**
Temperatura, notte	**17-20 °C**
Umidità	**80-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Nelle ascelle fogliari (ad es. bromelie)**
Maturità sessuale	**10-12 mesi**
Uova per deposizione	**4-8**
Periodo larvale	**65-75 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**In pericolo (EN)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sull'allevamento di *Excidobates mysteriosus*. Gli animali vivono in foresta montana umida vicino a bromelie e rocce, con giornate calde e notti fresche.
TEMPERATURA	La temperatura nelle località della specie non è stata misurata. 21-25 °C di giorno e 17-20 °C di notte si adattano al clima dei piedi dei rilievi. Le rane tollerano male il caldo, quindi evita periodi prolungati sopra i 27 °C.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere dell'80-100 % e il substrato deve restare umido tutto l'anno. Nebulizza con acqua osmotica o piovana una o due volte al giorno, oppure usa un impianto di pioggia o nebbia.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Una ciotola d'acqua non è necessaria, perché le rane ricevono umidità dalla nebulizzazione e dalle bromelie piene d'acqua.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e vive all'ombra di fitta vegetazione, quindi la luce deve soprattutto favorire la crescita delle piante e garantire un giorno di 12 ore. I raggi UVB non sono necessari, ma sono facoltativi.
ALIMENTAZIONE	*Excidobates mysteriosus* è abbastanza grande da prendere moscerini della frutta privi di ali (*Drosophila melanogaster*), collemboli e, da adulto, *Drosophila hydei*. In natura la specie mangia formiche e piccoli ditteri.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è diurna e il maschio canta forte e spesso dalle piante e dalle rocce del terrario. È meglio tenerla in coppia, perché più animali insieme possono litigare. Le rane non vanno maneggiate, perché sono sensibili allo stress.
AREALE D'ORIGINE	Perù.