herpy

RANE FRECCIA

Granular Poison Frog

Oophaga granulifera

Oophaga granulifera è una piccola rana dardo velenosa diurna di 19-22 mm, originaria del versante pacifico della Costa Rica e dell'estremo Panama occidentale. La pelle è nettamente granulosa, il dorso rosso, arancione o verde oliva, mentre zampe e ventre vanno dal verde-bluastro al turchese. La specie vive lungo ruscelli ombreggiati nella foresta e la femmina nutre i girini con uova non fecondate.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Dendrobates granuliferus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**19-22 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**6 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**80 × 40 × 40 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**21-25 °C**
Temperatura, notte	**17-21 °C**
Umidità	**80-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Maturità sessuale	**12-18 mesi**
Uova per deposizione	**2-5**
Schiusa	**19-20 giorni**
Periodo larvale	**87-212 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Uova non fecondate della femmina**
Cure parentali	**Sorveglia le uova, trasporta i girini e nutre i girini con le uova**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Vulnerabile (VU)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sulla gestione di *Oophaga granulifera* e la specie è rara nell'hobby.
TEMPERATURA	La temperatura diurna deve essere di 21-25 °C e le rane sono più attive a 20-22 °C. Di notte la temperatura deve scendere di 4-5 °C, a circa 17-21 °C. La variazione stagionale è minima, circa 1-2 °C.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere dell'80-90 %, e del 100 % la mattina presto e a fine giornata, quando il terrario viene nebulizzato.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Una vaschetta d'acqua bassa, profonda 1-2 cm, ad esempio una ciotola bassa interrata nel fondo o una zona d'acqua tra le pietre, fornisce acqua da bere e umidità.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie vive nel sottobosco ombreggiato, quindi la luce deve soprattutto coprire le esigenze delle piante.
ALIMENTAZIONE	Gli adulti ricevono piccoli moscerini della frutta incapaci di volare, collemboli, microgrilli appena nati, le larve più piccole di tarma della cera e plancton da prato.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Oophaga granulifera* è timida e vive molto nascosta, soprattutto nella stagione secca, quando si ritira quasi del tutto.
AREALE D'ORIGINE	Costa Rica e Panama.