herpy

RANE FRECCIA

Lehmann's Poison Frog

Oophaga lehmanni

Oophaga lehmanni è una rana velenosa rara e diurna, originaria di una piccola area della Colombia occidentale, nera o marrone scuro con ampie fasce rosse, arancioni o gialle. In natura è in pericolo critico e in terrario hanno senso solo esemplari nati in cattività. La specie richiede un allevatore esperto: non tollera il caldo e i girini si nutrono esclusivamente di uova non fecondate deposte dalla femmina.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Dendrobates lehmanni*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**3-4 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**4-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale e foresta montana**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**60 × 60 × 60 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**22-24 °C**
Temperatura, notte	**17-19 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Su foglie sopra l'acqua**
Uova per deposizione	**3-10**
Schiusa	**14-28 giorni**
Periodo larvale	**60-90 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Uova non fecondate della femmina**
Cure parentali	**Sorveglia le uova, trasporta i girini e nutre i girini con le uova**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**In pericolo critico (CR)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Una coppia di *O. lehmanni* richiede un terrario di almeno 60 × 60 × 60 cm (lunghezza × larghezza × altezza), e più grande è meglio, soprattutto per la riproduzione.
TEMPERATURA	*O. lehmanni* proviene da una fresca foresta pluviale montana ed è più sensibile al caldo della maggior parte delle rane velenose. Sta meglio a 22-24 °C durante il giorno e non bisogna superare 24-25 °C, nemmeno per poco tempo.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 70-100 %: alta al mattino e alla sera, possibilmente con nebbia, così da arrivare al 100 %, e un po' più bassa a metà giornata, fino a circa il 70 %.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Le rane non hanno bisogno di una ciotola d'acqua, perché l'umidità copre il loro fabbisogno.
ILLUMINAZIONE E UVB	La rana è diurna e vive all'ombra sotto la chioma della foresta.
ALIMENTAZIONE	*O. lehmanni* mangia solo piccoli artropodi vivi. L'alimento principale sono i moscerini della frutta atteri, e la specie è abbastanza grande da prendere anche i più grandi *Drosophila hydei*.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*O. lehmanni* è diurna e tranquilla, ma i maschi sono territoriali e cantano da postazioni fisse. Tieni la specie in coppia.
AREALE D'ORIGINE	Colombia.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/rane-freccia/oophaga-lehmanni