herpy

RANE FRECCIA

## Strawberry Poison Frog

# *Oophaga pumilio*

*Oophaga pumilio* è una piccola rana velenosa diurna di 17-24 mm, originaria delle foreste pluviali dell'America centrale, nota per le sue numerose varianti di colore e per un insolito accudimento della prole: la femmina nutre ogni girino con uova non fecondate. È affascinante da osservare, ma richiede esperienza, prede di piccolissime dimensioni e pazienza.

Famiglia: Dendrobatidae  Nome precedente: *Dendrobates pumilio*

DATI ESSENZIALI

### L'ANIMALE

| | |
|---|---|
| Dimensioni da adulto | **17-24 mm**<br>lunghezza muso-cloaca |
| Aspettativa di vita | **10-15 anni** |
| Attività | **Di giorno** |
| Stile di vita | **Terrestre** |
| Habitat | **Foresta pluviale** |
| Tossine cutanee in natura | **Lievi** |
| Tossine cutanee in cattività | **Nessuna**<br>Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo |
| Difficoltà | **Esperto** |

### CURA

| | |
|---|---|
| Terrario min. | **45 × 45 × 45 cm**<br>L × P × H per 4 adulti |
| Temperatura, giorno | **22-26 °C** |
| Temperatura, notte | **19-21 °C** |
| Umidità | **70-100%** |
| Acqua | **Ciotola d'acqua**<br>profondità 1 cm |
| UVB | **Facoltativi**<br>Zona Ferguson 1 |
| Alimentazione | **Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)** |
| Detenzione | **In coppia o in gruppo** |

### RIPRODUZIONE

| | |
|---|---|
| Riproduzione | **Ovipara** |
| Sviluppo | **Girini trasportati fino all'acqua** |
| Luogo di deposizione | **Sul terreno** |
| Maturità sessuale | **10 mesi** |
| Uova per deposizione | **3-5** |
| Schiusa | **10-14 giorni** |
| Periodo larvale | **42-56 giorni**<br>dalla schiusa alla metamorfosi |
| Alimentazione delle larve | **Uova non fecondate della femmina** |
| Cure parentali | **Sorveglia le uova, trasporta i girini e nutre i girini con le uova** |

### TUTELA E DOCUMENTI

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendice II** |
| IUCN | **Minima preoccupazione (LC)** |

## La cura in breve

| | |
|---|---|
| **IL TERRARIO** | Una coppia o un piccolo gruppo fino a quattro animali richiede un terrario di almeno 45 × 45 × 45 cm (lunghezza × larghezza × altezza). Più animali richiedono più superficie di base. |
| **TEMPERATURA** | Di giorno servono 22-26 °C, meglio intorno ai 24 °C, e di notte 19-21 °C. Temperature inferiori a 18 °C o superiori a 32 °C per periodi prolungati possono essere letali. |
| **UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE** | L'umidità dell'aria deve essere alta, 70-100 %. Punta al 70-80 % di giorno e fin quasi al 100 % di notte, ad esempio con nebulizzazione quattro volte al giorno da un impianto automatico. |
| **ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA** | Basta una ciotola d'acqua bassa, ma l'acqua deve arrivare al massimo a circa ¾ dell'altezza della rana, in pratica meno di 1 cm, perché la specie nuota male e può annegare. |
| **ILLUMINAZIONE E UVB** | Fornisci 12 ore di luce al giorno, in modo che le piante prosperino. Una lampada LED per piante che scalda poco è una buona scelta. |
| **ALIMENTAZIONE** | *Oophaga pumilio* richiede prede molto piccole, al massimo circa 2 mm. Piccole *Drosophila melanogaster* senza ali e collemboli sono l'alimento base, integrati con afidi, termiti e altre piccole prede. |
| **COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE** | *Oophaga pumilio* è diurna, sicura di sé e curiosa, e si muove molto tra il fogliame. I maschi difendono i territori con un canto ronzante, simile a quello dei grilli, e possono combattere con altri maschi. |
| **AREALE D'ORIGINE** | Nicaragua, Costa Rica e Panama. |