herpy

RANE FRECCIA

Vicente's Poison Frog

Oophaga vicentei

Oophaga vicentei è una rana dardo velenosa piccola, dai colori vivaci e diurna, che raggiunge i 24 mm e vive solo nel Panama centrale. I colori variano dal giallo al rosso, dal blu al grigio e al verde, spesso con un reticolo nero. La specie è minacciata in natura e le conoscenze sulla sua gestione sono scarse.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Dendrobates vicentei*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**12-24 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 60 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**22-26 °C**
Temperatura, notte	**19-21 °C**
Umidità	**80-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Nelle ascelle fogliari (ad es. bromelie)**
Uova per deposizione	**1-12**
Schiusa	**10-14 giorni**
Periodo larvale	**42-56 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Uova non fecondate della femmina**
Cure parentali	**Sorveglia le uova, trasporta i girini e nutre i girini con le uova**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**In pericolo (EN)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Le conoscenze sulla gestione di *Oophaga vicentei* sono scarse.
TEMPERATURA	La temperatura diurna deve essere di 22-26 °C e quella notturna di 19-21 °C. Le rane sopportano male il caldo, quindi evita periodi prolungati sopra i 28 °C.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere dell'80-100 % e mai inferiore al 70 %.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Basta una ciotola bassa con 1-2 cm di acqua, perché le rane sono pessime nuotatrici. Tienila pulita e cambia l'acqua ogni giorno o a giorni alterni.
ILLUMINAZIONE E UVB	Gli UVB difficilmente sono necessari, ma un po' di UVB (zona Ferguson 1) non nuoce ed è facoltativo. Un'illuminazione per piante per 10-12 ore al giorno mantiene vive le piante e la notte deve essere buia.
ALIMENTAZIONE	La specie richiede prede molto piccole. L'alimentazione di base è composta da piccoli moscerini della frutta atteri (*Drosophila melanogaster*) e collemboli, integrati con afidi, piccole termiti e piccoli isopodi.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Oophaga vicentei* è diurna. Il maschio emette il richiamo da un punto in alto e individua il sito di riproduzione. Le femmine possono mangiare le uova di altre femmine, quindi la coppia è la soluzione più sicura.
AREALE D'ORIGINE	Panama.